

- с. 13.000'. ♂, ♀ adlt., 26—28. II. 1901, верхов. р. Гэ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. верхн. Меконга.
с. 13.500'. ♂, ♀ adlt., 4—13. V. 1901, обл. лѣвыхъ сѣв. прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.

Майскія и июнскія птицы въ довольно отрепанномъ нарядѣ. Февральская птица цвѣтомъ клюва не отличается отъ лѣтнихъ.

«Эти выюрки характерны для нагорья центральнаго Тибета и держатся какъ на самомъ плато (12.700'), такъ и по ущельямъ его горъ, по которымъ поднимаются до 14.000'.

44. *Montifringilla alpicola* (PALL.).

- 4490'. 3 ♂, 1 ♀, 1 ♀? adlt., 12—26. VIII. 1899, прав. бер. р. Буянту у гор. Кобдо, Алтай.
6860'. 3 ♂, ♀ adlt., 16. X. 1899, кл. Цзагадай-усу, дол. оз. Ногонъ-норъ, Гобійскій Алтай.

Двѣ изъ птицъ съ р. Буянту оканчиваютъ смѣну перьевъ хвоста и крыла, остальные, какъ и октябрьскія, почти закончили линьку; клювъ у всѣхъ въ переходной окраскѣ: верхняя челюсть въ большей части черная съ желтыми боками, нижняя — желтая съ полоской чернаго цвѣта у вершины.

«Въ окрестностяхъ г. Кобдо встрѣчались у горъ лѣваго берега р. Буянту, но прилетали стайками на водопой къ рѣкѣ.

«Въ Гобійскомъ Алтайѣ наблюдались на ключѣ Цзагадай-усу въ долинѣ озера Ногонъ-норъ, отъ котораго ближайшія горы находились въ разстояніи 7—8 верстъ. Птички прилетали на холодный ключъ въ полдень, пили здѣсь и купались между льдинокъ, а затѣмъ тотчасъ же перемѣщались въ теплую пыль, которой осыпали себя какъ куры; такое купанье повторялось нѣсколько разъ подъ рядъ. Стайка состояла изъ 40—50 особей и держалась по сосѣдству съ *Otocorys* и *Pseudalaudula*».

45. *Montifringilla adamsi* MOORE.

- 10.660—16.040'. ♂ adlt., 17—27. V. 1900, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда, басс. Желтой рѣки.
с. 13.500'. ♂ adlt., 1/2. V. 1901, обл. лѣв. прит. р. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
13.830'. ♀ adlt., 11—13. V. 1901, рѣч. Кундуръ-чю, лѣв. прит. р. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.

Клювъ у всѣхъ экземпляровъ весь совершенно черный, опереніе сильно отрепано.

«Этотъ видъ обыкновененъ въ бассейнѣ Голубой рѣки и вообще въ