

южной Гоби, подлѣ большой караванной дороги. Птички кормились на мѣстахъ остановокъ каравановъ остававшимися послѣ послѣднихъ зернами. Были довѣрчивы, но становились очень строгими, если испытывали преслѣдованіе».

Всѣ перечисленные экземпляры принадлежатъ къ типичной формѣ.

49. *Passer ammodendri ammodendri* SEWERTZ.

3180'. 2 ♂, ♀ adlt., 23—24. IX. 1899, дол. р. Шаргинъ-голь, прит. оз. Шаргинъ-цаганъ-норъ, Гоб. Алтай.

«Впервые встрѣчены въ урочищѣ Угумыръ у озера Шаргинъ-цаганъ-норъ, изобиловавшемъ родниками, стойбищами и кустарными зарослями. Своимъ поведеніемъ птички эти напоминаютъ нашихъ воробьевъ».

Эти три экземпляра окончили линяніе и въ совершенно свѣжемъ зимнемъ нарядѣ.

Вопросъ о различіи между *P. ammodendri* и *P. stoliczkae* я подробно разбираю въ своей обработкѣ матеріаловъ Н. М. Пржевальскаго, тутъ же скажу только, что лучшимъ діагностическимъ признакомъ ихъ является цвѣтъ нижней спины и надхвостья: у *P. ammodendri* эти части тѣла сѣрыя или въ свѣжемъ нарядѣ по крайней мѣрѣ сѣроватыя, а у *P. stoliczkae* всегда песочно-рыжія или буланья. На межлопаточной области и на махахъ 2-го разряда въ свѣжемъ перѣ у *P. ammodendri* рыжіи цвѣтъ развитъ иногда довольно сильно. Характерное для *P. stoliczkae* отсутствіе темныхъ наствольевъ на нижней спинѣ и надхвостьѣ иногда замѣчается и у *P. ammodendri* изъ самыхъ коренныхъ его мѣстонахожденій (напр. съ Джаны-дарьи, Или и т. д.) и притомъ не только въ зимнемъ нарядѣ, гдѣ настволья развиты вообще слабо, но и въ отрепанномъ лѣтнемъ перѣ. Рѣзко выраженныя настволья представляютъ, повидимому, признакъ старыхъ самцовъ; у самокъ *P. ammodendri* ихъ никогда не бываетъ и уже это одно исключаетъ ихъ изъ числа діагностическихъ признаковъ.

Области распространенія двухъ этихъ формъ, которыя могутъ быть признаны лишь конспецифичными, различны, но соприкасаются: *P. ammodendri* распространень къ сѣверу и западу отъ Тянь-шаня, а *P. ammodendri stoliczkae* свойственны странамъ къ югу и востоку отъ этой горной страны. Поэтому всѣ птицы изъ Чжунгаріи относятся къ *P. ammodendri*.

Отсутствіе наствольевъ у обоихъ половъ и во всѣхъ возрастахъ *P. stoliczkae*, появленіе ихъ только у самцовъ *P. ammodendri* и болѣе сильное развитіе у старыхъ изъ нихъ заставляеть видѣть въ *P. stoliczkae* болѣе обобщенную древнюю форму, а въ *P. ammodendri* прогрессирующую, новѣйшую.