

Взрослыя птицы въ сравнительно малопоношенномъ нарядѣ, молодыя — въ совершенно свѣжемъ гнѣздовомъ перѣ.

«Въ мартѣ была встрѣчена стайка, летавшая по арыкамъ, окаймленнымъ древесными насажденіями».

Гнѣздовой нарядъ этого вида до сихъ поръ еще не описанъ, почему пользуюсь случаемъ сдѣлать это тутъ.

Перья всего верха въ болѣе или менѣе явственныхъ бурыхъ или черновато-бурыхъ наствольяхъ, на головѣ и задней сторонѣ шеи съ оливково-бурими, на межлопаточной области, спинѣ, лопаточныхъ и кроющихъ крыла съ коричнево-бурими, на надхвостьѣ и кроющихъ хвоста съ рыжеватыми ободками; маховыя черныя съ желтой основной частью наружнаго и внутренняго опахала, махи 1-го разр. съ сѣроватыми вершинками, махи 2-го разр. съ такими же концами и болѣе или менѣе широкими песочными каймами на наружномъ опахалѣ, которыя особенно широки на махахъ 3 разр., не имѣющихъ сѣрыхъ концовъ; кроющія маховъ 1-го разр. черныя; перья крылышка черныя съ желтоватыми ободками; бока головы желтовато-бурые, въ неявственныхъ наствольяхъ, съ болѣе выраженной желтизной на мѣстѣ бровей и щекъ; горло блѣловатое, на границѣ щекъ желтое въ слабыхъ темныхъ наствольяхъ; зобъ, грудь и бока тѣла блѣднаго рыжевато-желтаго цвѣта въ рѣзкихъ наствольяхъ; середина груди и брюхо сѣро-желтаго цвѣта въ черныхъ стерженкахъ, почти исчезающихъ на брюхѣ; нижнія кроющія хвоста болѣе яркаго желтаго цвѣта въ узкихъ, но рѣзкихъ, черныхъ наствольяхъ; рулевыя черныя съ желтымъ основаніемъ и буровато-сѣрыми ободками. Клювъ блѣднаго роговаго цвѣта, середина нижней челюсти желтоватая; ноги желтовато-бурыя.

53. *Mycerobas carneipes* (HODGS.).

7100'. 2 ♀ adlt., II. 1900, кум. Чортэнтанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

10.560'. ♂, ♀ adlt., 5—7. IV. 1900, кум. Дуланъ-китъ, южн. окр. Южно-Кукуворскаго хребта.

с. 12.000'. ♂, ♀ adlt., 1—6. IX. 1900, р. Дза-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.

13.040'. ♂ adlt., II/3. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю (Меконгъ).

12.020'. 2 ♀ (♂) adlt., I/3. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой.

Сентябрьскія птицы въ потертомъ нарядѣ безъ признаковъ линянія; октябрьскій самецъ началъ мѣнять мелкое опереніе и рулевыя. Птицы изъ Бана-джунъ помѣчены самцами, но по наряду ничѣмъ не отличаются отъ самокъ.

«Въ еловыхъ лѣсахъ у кумирни Чортэнтанъ и вообще въ горахъ