

Гань-су въ февралѣ птицы держались по утрамъ на вершинахъ высокихъ елей, съ которыхъ раздавался ихъ голосъ, но самихъ птицъ не было видно, такъ какъ послѣднія совершенно сливались съ хвоей; онѣ становились замѣтными лишь тогда, когда лазали по вѣтвямъ, вскрывая шишки.

«Въ лѣсахъ Южно-Кукунорскаго хребта, въ окрестностяхъ кумирни Дулань-китъ, дубоносы эти держались въ апрѣлѣ мѣсяцѣ преимущественно по можжевельникамъ стайками.

«На рѣчкѣ Чокъ-чю, системы Дзэ-чю, притока Меконга, дубоносъ былъ обыкновененъ въ августѣ 1900 г. въ смѣшанныхъ лѣсахъ. На восходѣ солнца летитъ кормиться на древовидные можжевельники, причеиъ самецъ и самка одной пары постоянно перекликаются другъ съ другомъ; при внимательномъ разслѣдованіи можно замѣтить въ вершинахъ деревь и самихъ птичекъ.

«По Каму встрѣчался вездѣ, гдѣ только росъ можжевельникъ. Голосъ дубоноса монотонный. При опасности птицы поднимаются выше на дерево или перелетаютъ волнистымъ полетомъ высоко по воздуху на другую сторону ущелья».

#### 54. *Pyrrhula erythacus* ВЛУТН.

7100'. ♂ semadlt., ♀ adlt., 28. II. 1900, кум. Чортэнтанъ на р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

Грудь у самца тускло-желтаго цвѣта, восковаго оттѣнка, но отдѣльныя перья красноватыя.

«Почти за мѣсяцъ и не смотря на ежедневныя экскурсіи былъ встрѣченъ у Чортэнтана лишь однажды стайкой до 15 штукъ, которая держалась въ ущельѣ по березамъ. Голосъ походитъ на голосъ обыкновеннаго снѣгиря, но нѣжнѣе его. Къ выстрѣламъ относятся спокойно, но въ концѣ концовъ улетаютъ къ среднему поясу горъ».

#### Сем. *Alaudidae*.

#### 55. *Otocorys brandti brandti* DRESSER.

7220'. 2 ♂ adlt., 9—14. IX. 1899, озеро Хулму-норъ, Гобійскій Алтай.  
3710'. ♂ adlt., X. 1899, озеро Орокъ-норъ, Гобійскій Алтай.  
с. 4000'. 2 ♂ adlt., XII. 1899, центральная Гоби.  
с. 4000'. 2 ♂ adlt., X. 1901, центральная Гоби.

Одинъ изъ самцовъ съ озера Хулму-норъ несомнѣнно старый, другой — болѣе молодой, судя по меньшей чистотѣ розовыхъ тоновъ, зависящей отъ присутствія бурыхъ кончиковъ на перьяхъ особенно головы, по большому