

«Эти птички попались намъ у восточнаго склона Билютэ-дабанъ и держались по луговымъ уваламъ стайками, по-парно и въ одиночку. На дальнѣйшемъ пути жаворонки эти намъ болѣе не встрѣчались».

**61. *Calandrella brachydactyla dukhunensis* (SYKES).**

с. 12.000'. 6 ♂, 2 ♀, 7. IX. 1900, кум. Сурманъ на рѣч. Ю-чю, прит. Дзэ-чю, сист. Меконга.

Всѣ въ свѣжемъ перѣ и совершенно закончили линяніе. Біологическихъ замѣтокъ, относящихся къ этой формѣ, нѣтъ въ орнитологическомъ дневникѣ П. К. Козлова.

**62. *Calandrella tibetana* BROOKS.**

с. 13.000'. 5 (3) ♂, 2 ♀ adlt., 31. V. 1900, дол. р. Алыкъ-норинъ-холъ, истоки Желтой рѣки.

13.890'. ♂ adlt., 12—30. VI. 1900, оз. Оринъ-норъ (Русское), истоки Желтой рѣки.

11.990'. ♂ adlt., 10—18. IX. 1900, перепр. Гарту-тука на р. Дза-чю или верхн. Меконгѣ.

13.890'. 2 ♂ adlt., 1/3. VI. 1901, оз. Оринъ-норъ (Русское), истоки Желтой рѣки.

с. 13.000'. Гнѣзд. съ 2 яйц., 1. VI. 1900, дол. р. Алыкъ-норинъ-холъ, истоки Желтой рѣки.

Сентябрьскій самецъ смѣнилъ уже все мелкое перо, рули и махи, кромѣ двухъ первыхъ; третій и четвертый махи 1-го разр. отрастаютъ, какъ и большинство рулей.

Яйца, сообщаетъ мнѣ Г. Ф. Гёбель, съ очень слабымъ блескомъ и имѣютъ сравнительно грубую зернистость (*gunzeliches Korn*); по бѣловатому основному фону они густо покрыты очень блѣдными, слегка лиловыми сѣрыми глубокими пятнышками. Размѣры и вѣсъ яицъ:

	Ширина:	Длина:	Вѣсъ:
a.	14.5 mm.	20.0 mm.	14 ct./grm.
b.	14.5 »	20.0 »	12. »

Гнѣздо представляетъ очень плотную постройку и состоитъ изъ двухъ слоевъ: наружнаго, свитаго изъ прошлогодней травы, и внутренняго, тоже очень толстаго — изъ шерсти; за этимъ послѣднимъ слѣдуетъ уже самый лоточекъ, сложенный изъ болѣе нѣжнаго растительнаго матеріала и въ концѣ концовъ выложенный опять шерстью.

«Этотъ жаворонокъ встрѣченъ нами впервые на сѣверо-восточной окраинѣ Тибетскаго нагорья, на берегу озера Алыкъ-норъ. Здѣсь добыто пять экземпляровъ. Гнѣздо, найденное 1 іюня въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ