

рѣчки Алыкѣ-норинѣ-холѣ, было расположено на открытой песчано-глинистой равнинѣ, только кое-гдѣ поросшей низкими кустиками, у одного изъ которыхъ оно и помѣщалось. Внутри оно выстлано шерстью *Gazella picticauda* и содержитъ два яйца. Самка держалась у гнѣзда. Самцы наблюдались чаще въ высотѣ, откуда доносилось ихъ громкое, чрезвычайно пріятное пѣніе».

Кромѣ того жаворонки эти добыты въ бассейнѣ Меконга.

Длина крыла пяти майскихъ птицъ: 90.0, 91.5, 93.0, 93.5 и 97.0 mm.; трехъ іюньскихъ 94.5, 97.0, 98.5, августовской 98.5. Весьма вѣроятно, что экземпляры съ короткимъ крыломъ (по крайней мѣрѣ 90.0 и 90.5) суть самки и опредѣленіе пола не вѣрно.

63. *Pseudalaudula pispoletta seebohmi* SHARPE.

BIANCHI, Wiss. Res. Przew. Reis., Aves, pp. 311, 313. — Bull. Acad. Sc. St.-Petersb., (5) XXIII, 1906, p. 222.

с. 5500'. ♂ adlt., VIII. 1899, среднее течение р. Кобдо, Алтай.

с. 6000'. ♀ adlt., 31. VIII. 1899, ур. Талынъ-хара, дол. Тугюрюкѣ, зап. ок. хрб. Алтайнъ-нуру, Гобійск. Алтай.

3710'. 2 ♂ (1 ♀), 22—24. X. 1899, котлов. озера Орокъ-норъ, Гобійскій Алтай.

с. 4000'. ♂ adlt., XII. 1899, средняя Гоби.

с. 9000'. 3 ♂ adlt., IV. 1900, восточный Цайдамъ.

с. 9000'. ♂ adlt., 1/2. V. 1900, восточный Цайдамъ.

с. 4000'. 3 ♂ (1 ♀) adlt., X. 1901, средняя Гоби.

Птицы, добытыя въ августѣ, въ свѣжемъ мелкомъ перѣ, но не кончили еще смѣну маховыхъ и рулевыхъ, которыя еще не отрасли; у одной изъ нихъ два длинныхъ маховыхъ 3 разряда являются единственными остатками гнѣздоваго пера; у другой, взрослой, два длинные маха отрепаны. Такимъ образомъ маховыя 3 разряда смѣняются послѣдними изъ всѣхъ перьевъ.

Длина крыла октябрьскихъ птицъ съ Орокъ-нора 101.5 и 97.0, изъ средней Гоби 102.0, 101.0 и 99.0 mm.; декабрьскій самецъ изъ средней Гоби имѣетъ крыло въ 102; у апрѣльскихъ и майской птицъ, помѣченныхъ самцами, крыло равно 98.0, 97.5, 94.5 и 93.0 mm.

Всѣ собранные экспедиціей экземпляры относятся къ блѣдной, рыжеватой центрально-азиатской формѣ съ очень большимъ количествомъ бѣлага на крайнемъ рулѣ. Въ совершенно свѣжемъ перѣ эта форма слегка сѣрѣе, чѣмъ въ поношенномъ, въ которомъ рыжеватый цвѣтъ выраженъ рѣзче.

Біологическихъ замѣтокъ объ этой формѣ у П. К. Козлова не имѣется.