

Дза-чю системы Голубой рѣки въ маѣ мѣсяцѣ были заняты размноженіемъ; самцы усердно пѣли въ воздухѣ».

66. *Pterocorys mongolica* (PALL.).

- 4770'. 4 ♂ adlt., 28—29. IX. 1899, уроч. Халюнъ-голь, верх. р. Шаргинъ-голь, Гобійскій Алтай.
с. 11.000'. 3 ♂ adlt., 25—30. III. 1900, сѣв. бер. оз. Куку-норъ.
с. 11.000'. 2 ♂ adlt., 18—21. VIII. 1901, южн. бер. оз. Куку-норъ.

Августовскія птицы сильно линяютъ: почти все мелкое перо у нихъ уже зимнее.

«Началь попадаться въ долинь озера Хулму-норъ, особенно же обыкновеннымъ сдѣлался въ долинь Шаргинъ-цаганъ-нора. Очень строгъ; держится небольшими стайками отъ 2 до 6 штукъ. Въ долинь Куку-нора держался въ мартѣ мѣсяцѣ парами въ степныхъ участкахъ. Въ теплое время дня самцы поднимались на воздухъ, парили и пѣли, но не такъ усердно, какъ полевые жаворонки».

67. *Melanocoryphoides maxima* (GOULD).

BIANCHI, Bull. Acad. Sc. St.-Petersb., (5) XXIII, 1906, p. 222.

- с. 11.000'. 4 ♂, ♀ adlt., 25—30. III. 1900, сѣв. бер. оз. Куку-норъ.
13.890'. ♂, ♀ adlt., кон. VI. 1900, оз. Оринъ-норъ (Русское), истоки Желтой рѣки.
13.730'. ♂ adlt., 31. VII. 1900, оз. Рхомбо-мцо, въ верх. И-чю, прит. Ды-чю (Голубой р.).
15.680'. ♂, ♀ adlt., 28. III. 1901, перев. Гонъ-ла, водоразд. рѣч. Сэръ-чю и И-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.
9890'. ♀ juv., 13—15. VIII. 1901, оз. Далай-дабасу, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хрб.
14.540'. Гнѣздо съ 3 яйцами, 6. VII. 1900, рѣка Джагынъ-голь, бассейнъ Желтой рѣки.
14.200'. Гнѣздо съ 4 яйцами, 22. V. 1901, рѣчка Нацанъ-чю, бассейнъ Голубой рѣки.

Іюньскія и особенно іюльская птицы въ сильно изношенномъ перѣ; послѣдняя мѣняетъ перья на лбу, надхвостьѣ и четвертое маховое 1-го разряда. Экземпляръ съ озера Далай-дабасу въ гнѣздовомъ нарядѣ.

Отъ гнѣзда съ тремя яйцами взять только лоточекъ, другое же полное; послѣднее состоитъ изъ болѣе толстаго наружнаго слоя, свитаго изъ отмершихъ стебельковъ, волоконъ и другихъ частей растеній, и изъ болѣе тонкаго внутренняго слоя, образующаго лоточекъ и сложеннаго изъ тонкихъ стебельковъ, частью зеленыхъ листиковъ, травы. Лоточекъ другого гнѣзда состоитъ сплошь изъ зеленыхъ, повидимому бывшихъ еще свѣжими,