

78. *Motacilla personata* GOULD.

- 3480'. ♂ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.
 с. 6000'. ♂ adlt., нач. VIII. 1899, рѣка Суокъ или верхн. теч. Кобдо.
 с. 5000'. juv 1-a vest., 8—9. VIII. 99, долина рѣчки Хашуту, прит. нижн. теч. Кобдо.
 4490'. juv., 12—26. VIII. 99, правый берегъ рѣчки Буянту у гор. Кобдо.
 с. 6000'. juv., 31. VIII. 99, зап. оконеч. хребта Алтайнъ-нуру, Гобійскій Алтай.

Взрослыя птицы изъ станицы Алтайской и съ рѣки Суокъ въ окончательномъ нарядѣ, июльская въ поношенномъ брачномъ, августовская въ общемъ уже въ зимнемъ нарядѣ, но еще мѣняетъ маховыя и перья на зашейкѣ; верхняя часть горла у нея еще черная и только на подбородкѣ появились бѣлыя зимнія перья. Молодая птица съ рѣчки Хашуту въ первомъ, гнѣздовомъ нарядѣ: на темени рыхлыя сѣрыя перья, еще безъ полошейника на зобу, намѣченнаго только въ серединѣ нѣсколькими черными перышками, но на горлѣ уже много не распустившихся черныхъ перышекъ; такимъ образомъ черный цвѣтъ распространяется у этого вида до верхней части горла уже въ первомъ осеннемъ нарядѣ. Птица съ рѣчки Буянту имѣетъ еще сѣрые зашеекъ и темя, но бѣлый лобъ; зобъ и горло черные и только на подбородкѣ перья бѣлыя. Птица съ Алтайнъ-нуру нѣсколько старше птицы съ Буянту, такъ какъ на темени появилась у нея чернота; подбородокъ бѣлый, горло частью бѣлое.

79. *Motacilla hodgsoni* ВЛУТН.

- 12.860'. ♀ adlt., 27—30. VII. 1900, дол. рѣч. И-чю, прав. прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
 12.090'. 2 ♂, adlt. & semadlt., 9—20. VIII. 1900, кум. Чжэрку на р. Цзанда, прит. Ды-чю (Голубой р.).
 13.040'. ♂ adlt., III/з. IX. 1900, уроч. Яръ-чюнь на р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.
 13.040'. semiadlt., I/з. X. 1900, уроч. Яръ-чюнь на р. Баръ-чю.
 11.000'. ♂, ♀ adlt., 10—18. III. 1901, Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣка.

Взрослая птица съ И-чю въ полномъ нарядѣ, съ черной спиной и такими же горломъ и подбородкомъ, но въ сильно поношенномъ перѣ. Мартовскія птицы съ Голубой рѣки тоже въ полномъ, но въ совершенно свѣжемъ; у самки еще нѣсколько бѣлыхъ перьевъ на верхней части горла. Взрослый самецъ изъ Чжэрку (пол. VIII) линяетъ; онъ смѣнилъ уже все мелкое перо, рули и маховыя, но послѣднія еще не отрасли; верхняя часть горла у него бѣлая, но спина черная. Взрослый самецъ изъ Яръ-чюпа въ совершенно свѣжемъ зимнемъ нарядѣ: горло бѣлое, спина черная. Эти двѣ птицы указываютъ на то, что, получивъ разъ черную спину, птица не мѣ-