

няетъ ее на сѣрую даже зимой и что зимнія птицы съ сѣрой спиной не достигли еще полнаго возраста. Полувзрослая птица изъ Чжэрку имѣетъ сѣрую спину, но черный зашеекъ и темя, низъ тѣла какъ въ зимнемъ нарядѣ: подбородокъ и верхняя часть горла чисто-бѣлые, нижняя часть горла съ примѣсью бѣлаго; въ общемъ на нее походить и октябрьская птица изъ Ярѣ-чюна, которая однако моложе, такъ какъ имѣетъ на темени и на зашеекѣ лишь примѣсь чернаго цвѣта къ бѣлому. Въ переходныхъ нарядахъ *M. hodgsoni* отличается отъ *M. personata* довольно трудно, но у послѣдней сѣрый цвѣтъ верхней стороны тѣла много чище, безъ всякой примѣси чернаго пигмента.

Обширныя возрастныя и сезонныя измѣненія наряда бѣлыхъ трясогузокъ постоянно вводятъ въ заблужденіе собирателей при различеніи видовъ, а между тѣмъ точное опредѣленіе взрослыхъ птицъ и правильное отнесеніе къ нимъ молодыхъ на мѣстѣ существенно необходимо, такъ какъ отличіе молодыхъ и полувзрослыхъ птицъ въ шкуркахъ сопряжено часто съ непреодолимыми трудностями. Взрослыя птицы, получившія уже черное темя и затылокъ, могутъ быть легко различены по нижеслѣдующей табличкѣ, въ которую я ввожу всѣ виды, встрѣчающіеся въ Азіи. Совершенно взрослыя птицы имѣютъ въ брачномъ нарядѣ сплошь черное горло и подбородокъ, въ зимнемъ же перѣ эти части бѣлыя. У *M. leucopsis* распространеніе чернаго цвѣта зоба вплоть до подбородка наблюдается, однако, рѣдко, вѣроятно только у очень старыхъ особей.

- a. Отъ основанія клюва къ затылку поперекъ глаза тянется темная или черная полоска.
Ушныя бѣлыя.
- b. Спина черная или съ примѣсью чернаго, у старыхъ махи 2-го разряда сплошь или большею частью бѣлые, а махи 1-го разряда бѣлые съ черными концами.
M. lugens ♂ adlt.
- b'. Спина сѣрая.
- c. На махахъ 2-го, иногда уже и 1-го разряда много бѣлаго цвѣта въ основной части.
Надхвостье черноватое. Сѣрый цвѣтъ спины темный.
M. lugens ♀ adlt.
- c'. Махи 1-го и 2-го разряда темные, лишь съ бѣлыми оторочками.
- d. Надхвостье черноватое, сѣрый цвѣтъ спины менѣе чистый. — До появленія бѣлаго цвѣта на маховыхъ отличіе отъ слѣдующаго вида ненадежно, если нѣтъ хотя бы незначительныхъ слѣдовъ появленія черноты на сѣрыхъ перьяхъ спины.
M. lugens ♂ ♀ semiadlt.
- d'. Надхвостье сѣрое, только верхнія кроющія хвоста черныя. Спина чистаго сѣраго цвѣта во всѣхъ нарядахъ.
M. ocularis.
- a'. Поперекъ глаза нѣтъ темной или черной полосы.
- e. Ушныя бѣлыя.
- f. Спина черная или съ примѣсью чернаго, или по крайней мѣрѣ малыя кроющія крыла черныя. Концы чернаго полуошейника на зобу далеко не доходятъ до ушныхъ.
M. leucopsis.