

- f'*. Спина всегда сѣрая, безъ примѣсы черныхъ перьевъ или отложеній черного пигмента. Концы черного полушеяника на зобу доходятъ до ушныхъ.
- g*. Бѣлые кончики большихъ и среднихъ кроющихъ крыла образуютъ лишь двѣ бѣлыхъ перевязи. **M. alba.**
- g'*. Бѣлый цвѣтъ на большихъ и среднихъ кроющихъ крыла развитъ очень сильно, такъ что получается болѣе или менѣе сплошное бѣлое пятно на крылѣ.
- h*. Бока шеи сплошь бѣлые, такъ что черный цвѣтъ зашейка отдѣленъ отъ черного цвѣта зоба. **M. baicalensis.**
- h'*. Черный цвѣтъ зоба соединенъ съ чернымъ цвѣтомъ зашейка по крайней мѣрѣ узкой черной полоской, расположенной кзади отъ ушныхъ, или бока шеи болѣею частью или сплошь черные. **M. persica.**
- e'*. Ушныя черныя.
- i*. Лобъ и передняя часть темени бѣлые.
- k*. Спина чистаго сѣраго цвѣта. **M. personata.**
- k'*. Спина черная или съ какою-либо примѣсью черного пигмента. — До появленія послѣдняго не отличимы съ полною увѣренностью отъ *M. personata*, хотя сѣрый цвѣтъ спины всегда темнѣе и довольно сильно развитъ на надхвостѣ.
- l*. Кроющія маховъ 1-го разряда черныя съ пепельно-сѣрыми оторочками; основаніе маховъ 2-го разряда черное. **M. hodgsoni.**
- l'*. Кроющія маховъ 1-го разряда бѣлыя съ небольшимъ количествомъ черного на кончикѣ; основаніе маховъ 2-го разряда бѣлое. **M. grandis.**
- i'*. Весь верхъ головы до самаго клюва черный, только брови бѣлыя. **M. maderaspatensis.**

### 80. *Calobates melanope* (PALL.).

3480'. ♀ adlt., VI. 1899, станица Алтайская.

3480'. juv. 1-a veste, 1/2. VII. 1899, станица Алтайская.

«Встрѣчалась нерѣдко по горнымъ рѣчкамъ и ключамъ, поросшимъ лѣсами».

### 81. *Budytes citreoloides* HODGS.

с. 13.000'. ♂, ♀ adlt., 10—21. VII. 1900, рѣч. Хи-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой р.

12.020'. ♂ adlt., 13. IV. 1901, сел. Бана-джунъ, рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.

12.090'. ♂ adlt., 25—28. IV. 1901, лѣв. бер. р. Дза-чю, прит. Голубой рѣки.

«У Бана-чжунъ показалась на весеннемъ прилетѣ 13 апрѣля, одиночкой, но затѣмъ стала появляться въ долину Дза-чю все чаще и чаще».

### 82. *Budytes citreola* (PALL.).

12.090'. 2 ♂, 1 ♀ adlt., 25—28. IV. 1901, лѣвый берегъ р. Дза-чю, притокъ Голубой рѣки.

Добыты вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ и замѣчаніе о появленіи въ долину Дза-чю относится и къ этому виду. У самцовъ спина сѣрая (безъ