

отдѣльныхъ черныхъ пятенъ), на зашейкѣ рѣзко ограниченный черный полушейникъ, верхнія кроющія хвоста и сосѣднія перья надхвостья черныя; у одного экземпляра на ушныхъ и темени немного, на затылкѣ же очень много черныхъ перьевъ, у другого остались только слѣды черного цвѣта. Самка въ очень ярко окрашенномъ и свѣжемъ перѣ; спина у нея сѣрая съ очень слабымъ оливковымъ оттѣнкомъ, котораго вовсе нѣтъ на надхвостѣ, голова почти оливковая съ желтоватымъ оттѣнкомъ, лобъ почти желтый, брови ярко-желтого цвѣта восковаго оттѣнка.

83. *Budytes flava* (Linn.).

6540'. ♂, ♀ adlt., 5. IX. 1899, рѣчка Борджонъ-голь, хрб. Алтайнъ-нуру, Гобійскій Алтай.

Обѣ птицы съ широкой бѣлой бровью; у самца голова довольно свѣтлаго сѣраго цвѣта, на темени и затылкѣ вслѣдствіе свѣжести перьевъ съ примѣсью оливковаго; по срединѣ ушной области лишь слѣды бѣловатой полоски.

«На осеннемъ пролетѣ впервые наблюдались 5-го сентября и держались въ обществѣ бѣлыхъ трясогузокъ (*M. personata* или *M. baicalensis*) по чистымъ ручейкамъ долины Борджона. При періодически набѣгавшемъ вѣтрѣ прятались въ густыя заросли дэрэсуна, но успѣшно ловили мелкихъ жучковъ, не смотря на стужу. Затѣмъ была встрѣчена 12 сентября при озерѣ Хулму-норъ».

Сем. Troglodytidae.

84. *Troglodytes neglectus* Brooks.

с. 13.000'. juv., 30. VIII. 1900, рѣч. Чокъ-чю, сист. Дза-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.

13.040'. ♂ adlt., III/3. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Дза-чю (Меконга).

13.040'. ? ♂ adlt., X. 1900, р. Баръ-чю.

11.430'. ♀ adlt., 27—29. X. 1900, р. Ному-чю, прит. Дза-чю (Меконга).

Птички, добытыя въ августѣ, въ рыхломъ перѣ гнѣздоваго наряда, но съ отросшими уже маховыми и рулевыми; отличаются отъ взрослыхъ только болѣе тусклымъ цвѣтомъ и отсутствіемъ бѣлыхъ пятнышекъ на концахъ среднихъ кроющихъ крыла.

«Держался на рѣчкѣ Баръ-чю въ еловомъ лѣсу, у корней деревьевъ и былъ тутъ обыкновененъ».

Привезенные экспедиціей экземпляры почти не отличимы отъ *T. neg-*