

*lectus*, полученнаго нашимъ Музеемъ отъ Британскаго музея. Къ сожалѣнію я не имѣлъ возможности сравнить ихъ съ *T. nepalensis*.

### Сем. Certhiidae.

#### 85. *Certhia familiaris bianchii* HARTERT.

7100'. 3 ♂ adlt., 1—4. III. 1900, бивуакъ экспед. при кум. Чортэнтанъ басс. р. Тэтунгъ-голь, Нань-шань.

«Въ бассейнѣ р. Тэтунгъ-гола «въ мартѣ мѣсяцѣ держалась у кумирни Чортэнтанъ въ хвойномъ лѣсу, но въ морозные (— 15 до — 20°) дни февраля показывалась по утрамъ на столѣтнихъ тополяхъ, росшихъ у бивуака».

Форма эта, недавно выдѣленная HARTERT'омъ<sup>1)</sup>, едва отличима отъ *C. familiaris familiaris* нѣсколько болѣе темной окраской верха, обусловленной болѣе слабымъ развитіемъ бѣлыхъ отмѣтинъ, явственно соловымъ оттѣнкомъ низа тѣла, который ограниченъ у *C. familiaris familiaris* только боками тѣла, и замѣтно болѣе рыжими нижними кроющими хвоста.

У двухъ изъ привезенныхъ П. К. Козловымъ экземпляровъ свѣтлое пятно на серединѣ наружнаго опахала четвертаго маха развито хорошо, у одного же имѣется лишь слабый намекъ на него. Такое же слабое развитіе этого пятна я нахожу и у одного изъ 9 экземпляровъ, добытыхъ Н. М. Пржевальскимъ. Недоразвитіе пятна на четвертомъ махѣ представляетъ тутъ, очевидно, не болѣе какъ индивидуальное уклоненіе и не даетъ еще права относить такіе индивиды къ *C. hodgsoni*, у которой общая окраска верха тѣла по BROOKS'у блѣдная, съ преобладаніемъ сѣроватаго оттѣнка. HARTERT впрочемъ приписываетъ *C. hodgsoni* такую же окраску какъ у *C. familiaris macrodactyla*, а окраску *C. familiaris bianchii* считаетъ тоже болѣе подходящей къ этой послѣдней.

Кромѣ бассейна рѣки Тэтунгъ-голь и Южно-Тэтунгскаго хребта въ восточномъ Нань-шанѣ, гдѣ ее собиралъ и Н. М. Пржевальскій<sup>2)</sup> во время перваго и третьяго своего путешествій, *C. familiaris bianchii* найдена Пржевальскимъ во время четвертаго путешествія на верхнемъ теченіи Желтой рѣки въ хребтѣ Джупаръ или Ревенномъ, на рѣкѣ Бага-горги и въ хребтѣ Муджикъ, а экспедиціей братьевъ Грумъ-Гржимайло въ бассейнѣ рѣки Бабо-хэ, къ сѣверу отъ бассейна Тэтунгъ-гола, въ Нань-шанѣ.

1) Vög. paläarkt. Fauna, I, p. 321 (1905).

2) *C. familiaris* apud PLESKE, Wiss. Res. Przew. Reis., II, Aves, p. 177, (1894).