

Пищухъ, собранныхъ Н. М. Пржевальскимъ¹⁾ во время второго и четвертаго путешествій въ центральномъ Тянь-шанѣ, какъ и вообще тянь-шаньскихъ птицъ, НАУТЕРТ правильно выдѣляетъ въ особый подвидъ — *C. familiaris tianschanica*.

86. *Certhia khamensis* BIANCHI,

in SHARPE's, Hand-list Birds, IV, pp. 355, 360 (1903).

- с. 13.000'. juv., 31. VIII. 1900, рѣч. Чокъ-чю, сист. Дзэ-чу, прит. Меконга.
- с. 11.000'. ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю (Меконгъ) къ с. отъ г. Чамдо.
- 11.960'. 2 ♂, ♀ adlt., XII. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. притокъ Меконга.

Августовская птица еще въ рыхломъ гнѣздовомъ перѣ. У птицы, помѣченной самкой, клювъ значительно короче (отъ передняго края ноздри до конца нижней челости²⁾ равенъ 11.75 mm.), чѣмъ у самцовъ (14.0, 14.5, 16.0 mm. до конца верхней челости, по хордѣ).

Въ бассейнѣ Меконга «на рѣчкѣ Чокъ-чю, Дза-чю и Дэ-чю», притокѣ Рэ-чю, «наблюдалась въ еловыхъ лѣсахъ».

Всѣ пять экземпляровъ пищухъ изъ бассейна Меконга значительно темнѣе даже самыхъ темныхъ птицъ (№ 12114 и 12115), собранныхъ Н. М. Пржевальскимъ въ Нань-шанѣ и на истокахъ Желтой рѣки. Отъ типичной *C. familiaris* они легко отличаются черными ободками перьевъ на верхѣ головы, зашейкѣ и межлопаточной области, которые у *C. familiaris* различныхъ оттѣнковъ бураго цвѣта. Вслѣдствіе этого названныя части тѣла представляютъ у нашихъ птицъ болѣе рѣзкій контрастъ съ окраской средней части спины, чѣмъ у *C. familiaris*. Даѣе, бока тѣла и брюхо у нашихъ экземпляровъ не соловаго, а дымчатаго оттѣнка, въ замѣтномъ контрастѣ съ рыжеватыми нижними кроющими хвоста, тогда какъ у *C. familiaris* подхвостье отличается отъ боковъ тѣла лишь большей интенсивностью того же соловаго или рыжеватаго цвѣта. Наконецъ ни у одного экземпляра нѣть никакого намека на свѣтлое пятно наружнаго опахала четвертаго маховаго 1-го разряда: блѣдно-рыжее пятно появляется лишь на пятомъ махѣ. Послѣднее обстоятельство заставляетъ отнести птицъ изъ бассейна Меконга къ группѣ *C. nepalensis* и *C. hodgsoni*, у которыхъ пятна эти начинаются не съ четвертаго, а тоже съ пятаго маха. Отъ обоихъ этихъ видовъ птицы, собранныя въ системѣ Меконга (Камъ), отличаются тоже легко. У *C. nepalensis* BLYTH изъ Darjeeling'a ободки перьевъ го-

1) *C. familiaris* var. *scandulaca* apud PLESKE, I. c., p. 178.

2) Верхняя обломана, но у самцовъ она всего 0.5—1.0 mm. длиннѣе нижней.