

ловы, зашейка и спины черные, какъ у камскихъ птицъ, но въ общемъ контрастъ между передними частями верха и серединою спины слабѣе, чѣмъ у этихъ послѣднихъ; весь верхъ тѣла несравненно рыжѣе, чѣмъ у камскихъ птицъ, такъ какъ всѣ свѣтлыя части перьевъ верха (кромѣ обычныхъ бѣлыхъ пастволей на нѣкоторыхъ перьяхъ) интенсивнаго ржаво-рыжаго цвѣта, а не рыжеватого-соловаго или буровато-рыжаго, какъ у нашихъ; у послѣднихъ только цвѣтъ надхвостья болѣе яркаго рыжаго цвѣта, у одного экземпляра даже явственно ржаваго, хотя менѣе интенсивнаго, чѣмъ у *C. nepalensis*, оттѣнка. Бока живота и брюхо у *C. nepalensis* рѣзко рыжаго оттѣнка, а не дымчатаго, какъ у птицъ изъ Кама. Экземпляровъ *C. hodgsoni* въ моемъ распоряженіи нѣтъ, но наши птицы не могутъ относиться къ этой формѣ уже потому, что она въ общемъ блѣдная, сверху по Brooks'у<sup>1)</sup> съ преобладаніемъ сѣроватаго оттѣнка, а не соловаго или рыжеватаго, какъ у *C. familiaris*, и по Oates'у<sup>2)</sup> менѣе черная, чѣмъ *C. nepalensis*. Съ группой *C. discolor*, *C. stoliczkae* и *C. manipurensis* камскія птицы не имѣютъ ничего общаго. Такимъ образомъ птицы, добытыя экспедиціей въ Камѣ, не могутъ быть отнесены ни къ одной изъ описанныхъ до сихъ поръ формъ рода *Certhia* и должны получить названіе *Certhia khamensis*. Диагнозъ ея будетъ слѣдующій:

*Certhia cauda haud vel obsoletissime transversim taeniata, gutture pectoreque toto pure sericeo-albis, pogonio externo remigis quartae primi ordinis in medio sine macula fulvescente, marginibus plumarum capitis superioris, auchenii interscapuliique nigris, nec brunneis, striis medianis plumarum capitis, colli superioris dorsique fulvescentibus, nec ferrugineis, lateribus abdominis abdomineque ipso fumosis, nec distincte rufescentibus.*

Размѣры 5 экземпляровъ этой формы слѣдующіе:

	Крыло.	Хвостъ.	Culmen.	Плюсна.	Задній палець.	Его коготь.
♂ adlt., Дза-чю . . .	69.0 mm.	67.5 mm.	21.5 mm.	—	9.0 mm.	9.0 mm.
♂ adlt., Рэ-чю . . .	69.5 »	66.5 »	21.5 »	17.5 mm.	8.5 »	10.5 »
♂ adlt., Рэ-чю . . .	70.0 »	70.0 »	22.5 »	—	9.0 »	10.0 »
♀ adlt., Рэ-чю . . .	66.5 »	66.0 »	с. 18.5 »	16.0 »	9.0 »	9.0 »
— juv., Чокъ-чю . . .	68.5 »	71.5 »	17.0 »	—	—	—

Цвѣтъ голыхъ частей тѣла по П. К. Козлову слѣдующій: радужина темно-бурая; верхняя челюсть клюва бурая, нижняя — свѣтлая; ноги буросѣрыя.

1) Journ. Asiat. Soc. Bengal, XLI, 1872, ii, p. 74.

2) Faun. Brit. India, Birds, i, p. 333, (1889).