

какъ у *S. leucopsis* этотъ цвѣтъ идетъ не далѣе боковъ задней части груди и разомъ прерывается тутъ. Остальной низъ тѣла у всѣхъ 11 экземпляровъ *S. przewalskii* рыжій, ржаваго оттѣнка, тогда какъ у *S. leucopsis* онъ, судя по описаніямъ, либо бѣлый, либо съ соловымъ оттѣнкомъ (pale fulvous—OATES). На зобу у *S. przewalskii* замѣчается явственное потемнѣніе этого ржаво-рыжаго цвѣта, причемъ у нѣкоторыхъ экземпляровъ получается нѣчто въ родѣ неявственнаго полуошейника, соединяющаго каштаново-рыжій цвѣтъ одной стороны тѣла съ таковымъ другой стороны. У *S. leucopsis*, судя по нашему экземпляру, рисунку и описаніямъ, зобъ наоборотъ очень блѣденъ. Наконецъ, *S. leucopsis* нѣсколько крупнѣе *S. przewalskii*. Размѣры 11 извѣстныхъ до сихъ поръ экземпляровъ слѣдующіе:

	Culmen.	Ulna.	Cauda.	Tarsus.
♂, VII. 85, Min-tscheu, Kan-su mer.-occid., BEREZOWSKI. . .	17.0	73.0	43.0	18.0
♀, IV. 80, fluv. Umu, Hwang-ho sup., PRZEWALSKI № 12.102.	16.0	70.0	42.0	16.0
♂, XI. 00, fluv. Dsa-tschu sive Mekong, KOZLOW. . . (a).	16.0	75.0	44.0	18.0
♂, do (b).	17.0	72.5	43.0	18.5
♂, do (c).	17.0	71.0	46.0	17.5
♂, do (d).	16.0	71.0	44.0	17.5
♂, do (e).	17.0	72.7	44.5	18.0
♀, do (f).	16.0	73.5	42.0	18.5 (!)
♂, XII. 00, fluv. Re-tschu, syst. Mekong, KOZLOW. . . (g).	17.1	75.0	45.0	19.0
♂, I. 01, fluv. Re-tschu, syst. Mekong, KOZLOW. . . (h).	17.1	72.5	43.0	18.0
♀, III. 01, fluv. Nam-tschu, syst. Yang-tsz'-tsiang, KOZLOW (i).	17.0	74.0	43.0	18.0

Такимъ образомъ, длина culmen'a колеблется у *S. przewalskii* между 16 и 17.1, а длина крыла отъ 70.0 до 75.0 mm. У экземпляра *S. leucopsis*, находящагося въ моемъ распоряженіи, culmen 18.5, ulna 77.5, cauda 48.5, tarsus 19.0 mm., десять же экземпляровъ SCULLY¹⁾ изъ Gilgit'a дали слѣдующіе размѣры: клювъ отъ зѣвковъ 20.32—21.84 (0.80—0.86), крыло 74.93—80.01 (2.95—3.15), хвостъ 43.18—48.26 (1.7—1.9) и плюсна 17.78—18.54 mm. (0.70—0.73").

Оба вида — птицы высокогорныя, но области ихъ распространенія врядъ ли гдѣ соприкасаются. *S. leucopsis* свойственъ крайнему западу Гималаевъ отъ хребта Safed-Koh (7000'), къ юго-востоку отъ Кабула, до Гилгита (10.000) и Astor'a на сѣверъ и до восточныхъ границъ Кашмира на востокъ. *S. przewalskii* обитаетъ на восточной окраинѣ Тибетскаго нагорья, гдѣ пока прослѣженъ отъ бассейна верхняго Хуань-хэ (рѣка Ума, притокъ Баба-горги, на востокъ до деревни Ю-дзамъ-пу въ Миньжоускомъ округѣ юго-западнаго угла Гань-су) до бассейна Меконга въ области Чамдо. Пржевальскій добылъ его на высотѣ приблизительно 11.000 ф., М. М.

1) Ibis, 1881, p. 431.