

99. *Acredula caudata macrura* СЕЕВОИМ.

3480'. 2 juv., VII. 1899, станица Алтайская.

Длина хвоста 95 и 100 mm.

«У Алтайской станицы гнѣздилась по густымъ зарослямъ, сопровождавшимъ теченіе горныхъ рѣчекъ, и на опушкѣ лѣса».

Сем. *Panuridae*.100. *Panurus biarmicus sibiricus* ВОНАР.

с. 9000'. juv., 1/3. VIII. 1901, юго-восточный Цайдамъ.

У всѣхъ трехъ птицъ на спинѣ и на руляхъ развитъ черный цвѣтъ; всѣ онѣ въ первомъ гнѣздовомъ нарядѣ, но у одной перо уже окрѣпло и выкрасилось, такъ что всѣ цвѣта чище, ярче и рѣзче; у другой клювъ не желтый какъ у остальныхъ двухъ, а бурый; у третьей среднія кроющія крыла въ пленкахъ.

Сем. *Laniidae*.101. *Lanius sphenocercus* САВ.

6070'. ♂ adlt., 19. IX. 1901, сел. Сы-эръ-танъ-пу, сѣв. окраина Нань-шаня.
с. 5000'. ♂ adlt., 1/3. IX. 1901, сѣв. Ала-шань.

Легко отличается комбинаціей слѣдующихъ признаковъ: концы лопаточныхъ бѣлые, основная часть маховъ 2-го разр. бѣлая на обоихъ опахалахъ; надхвостье сѣрое, одноцвѣтное со спиной; три крайнія пары рулей сплошь или почти сплошь бѣлыя; малыя кроющія крыла свѣтло-сѣрыя. У *L. excubitor* двѣ крайнія пары рулей съ б. или м. количествомъ черного; у *L. homeyeri* и *L. leucopterus* надхвостье бѣлое въ контрастѣ съ сѣрой спиной; *L. giganteus* относится къ группѣ, имѣющей черное основаніе маховыхъ 2-го разр., на которыхъ въ бѣлый цвѣтъ окрашена лишь часть основанія внутренняго опахала.

«У селенія Сы-эръ-танъ-пу» (6070'), еще въ предѣлахъ сѣверной окраины Нань-шаня, «была замѣчена 19. IX. 1901 пара, державшаяся на высокихъ тополяхъ; послѣ выстрѣла по самцу самка далеко улетѣла».

Другой экземпляръ былъ добытъ нѣсколько позднѣе уже въ предѣлахъ Алашаньской пустыни (пески Тенгри).