

102. *Lanius giganteus* PRZEW.

- с. 9000'. ♀ adlt., II/з. III. 1900, хреб. Южно-Тетунгскій, Нань-шань.  
 10.500'. ♀ adlt., 5—6. IV. 1900, р. Дуланъ-голь, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хребта.  
 12.630'. ♂ juv. 1-а vest., 22. VIII. 1900, кум. Бэнчинъ-гомба, на рѣч. Гор-чю, притокѣ р. Цзанда, сист. Ды-чю (верхн. теч. Голубой).  
 11.990'. ♂ adlt., 14. IX. 1900, р. Дза-чю (Меконгъ) близъ перепр. Гарту-тука.  
 с. 13.000'. ♂ adlt., III/з. III. 1901, рѣч. И-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.  
 10.910'. ♂ adlt., pull., 13. VI. 1901, ущ. Хату, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будды, басс. Желтой р.  
 juv. 1-а vest., III/з. VII. 1901, ущ. Ихэ-голь, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будды.

*L. giganteus* принадлежитъ къ группѣ сѣрыхъ сорокопутовъ, имѣющихъ черное основаніе маховъ второго разряда; отъ остальныхъ средне-азиатскихъ видовъ этой группы онъ тотчасъ же отличается своею крупной величиной (крыло не меньше 127 mm. = 5", хвостъ не меньше 150 mm. = ок. 6"). Отъ *L. sphenocercus*, съ которымъ его часто смѣшивали собиратели и на котораго онъ походитъ сѣрымъ, одноцвѣтнымъ со спиной надхвостьемъ, онъ легко отличается отсутствіемъ бѣлаго цвѣта на основной части маховъ 2-го разряда, значительнымъ преобладаніемъ чернаго цвѣта на третьей съ краю парѣ рулей, которые лишь съ бѣлымъ концомъ, большей величиной и по крайней мѣрѣ преобладаніемъ чернаго цвѣта на малыхъ кроющихъ крыла. Въ первоначальномъ діагнозѣ Пржевальскаго положительно ошибка въ томъ, что онъ говоритъ: «tectricibus minimis alagum superioribus cinereis». По сравненію съ *L. sphenocercus* кроющія эти кажутся всегда черными, у птицъ въ лѣтнемъ перѣ они сплошь черны, а у птицъ въ свѣжемъ нарядѣ черны, лишь съ темно-сѣрыми концами, которые только у одного экземпляра въ отрепанномъ перѣ достигаютъ приблизительно половины длины пера, но основная половина перьевъ всеже черная.

Судя по отмѣткамъ пола на экземплярахъ, старые самецъ и самка другъ отъ друга ничѣмъ не отличаются. Самецъ, добытый 14. IX на Меконгѣ окончилъ линяніе и находится въ совершенно свѣжемъ нарядѣ<sup>1)</sup>. Верхъ тѣла у него нѣсколько темнѣе, чѣмъ у весеннихъ птицъ, вслѣдствіе того, что самый кончикъ перьевъ черноватый; на зобѣ и задней части груди явственный, но чрезвычайно блѣдный розоватый оттѣнокъ. У мартовскихъ и апрѣльскихъ птицъ верхъ тѣла болѣе чистаго и болѣе свѣтлаго сѣраго цвѣта, розовый оттѣнокъ на груди грязнѣе, но перо въ общемъ от-

1) Птицы, бывшія въ распоряженіи OGILVIE-GRANT (Novit. Zool., IX, 1902, p. 456), находятся не въ свѣжевылинявшемъ перѣ: — самка апрѣльская, въ весеннемъ нарядѣ, а самецъ майскій, въ очень поношенномъ перѣ.