

103. *Caudolanius tephronotus* (VIG.).

- 12.610'. 3 ♂ adlt., ♂ jun., ♀ adlt., 23—25. VII. 1900, окр. кум. Согонь-гомба на Ды-чю или верхн. теч. Голубой р.  
 с. 13.000'. ♂ adlt., ♂ jun., 8. VIII. 1900, ур. Доринь-до на рѣч. Дза-чю, прит. Цзанда, сист. Голубой р.  
 с. 12.000'. 2 ♂ juv. 1-a vest., 1—6. IX. 1900, р. Дзэ-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.  
 с. 14.000'. ♂ adlt., 19—20. IX. 1900, рѣч. Чамъ-чю, прит. Дза-чю (Меконга).  
 12.020'. ♂, ♀ adlt., 1/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.  
 11.660'. 2 ♀ jun., 17. IV. 1901, рѣч. Дэнъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.

Старые самцы и самки совершенно сходны другъ съ другомъ, если не считать того, что у послѣднихъ спина со слабымъ оливковымъ оттѣнкомъ; у птицъ, перенесшихъ вторую осеннюю линьку, рыжія перья надхвостья и верхнія кроющія хвоста рыжія безъ всякихъ слѣдовъ предконечныхъ бурыхъ перевязей, которыя болѣе или менѣе развиты на названныхъ частяхъ тѣла у болѣе молодыхъ, не достигшихъ года, птицъ (junior); спина у послѣднихъ бурѣе, чѣмъ у старыхъ, а у самки чуть рыжѣе, чѣмъ у самца; кроющія крыла и внутренніе махи 2-го и 3-го разр. съ рыжими каемочками (которыя бѣловаты и много уже у старыхъ), но безъ интенсивно-черной полоски передъ рыжей каймой. Птицы въ гнѣздовомъ нарядѣ, но уже съ совершенно отросшими рулями, съ верхней стороны въ общемъ буровато-рыжія съ темно-рыжимъ надхвостьемъ и верхними кроющими хвоста, снизу бѣловато-рыжія, на горлѣ и срединѣ испода бѣлѣе; всѣ перья какъ верха, такъ и низа, съ предконечной черновато-бурой перевязью; махи 3-го и внутренніе 2-го разряда съ рыжей каймой, передъ которой тянется черноватая полоска.

Во время этого путешествія впервые встрѣченъ въ іюлѣ въ окрестностяхъ кумирни Согонь-гомба (ок. 12.600'), въ бассейнѣ верхняго теченія Голубой рѣки. «Тутъ птицы гнѣздились, занявъ обросшія кустарникомъ балки. Обыкновенно сидѣли на вершинѣ куста, въ общемъ напоминая *Otomela*, но голосомъ отличались отъ другихъ сорокопутовъ. Къ концу іюля повидимому уже вывели птенцовъ». Въ первой половинѣ августа наблюдался въ урочищѣ Даринь-до въ окрестностяхъ кумирни Чжэрку на рѣчкѣ Дза-чю, впадающей въ рѣчку Цзанда, притокъ Голубой, и «въ это время находился въ линяніи», хотя часть птицъ (одна старая, другая болѣе молодая) еще не приступили къ смѣнѣ пера. На возвратномъ пути въ бассейнѣ Голубой рѣки, градуса на два восточнѣе, на рѣчкѣ Сэръ-чю, притокъ Дза-чю, у селенія Бана-джунъ была замѣчена 15 апрѣля 1901 «первая прилетная пара», послѣ чего «сталъ уже часто показываться выше по рѣчкѣ, въ долинѣ рѣчки Дэнъ-чю, покрытой густымъ кустарникомъ».