

няетъ, какъ нашъ жуланъ, очень рано, вѣроятно еще во время вывода дѣтей.

Возможно, что приведенная выше замѣтка П. К. Козлова относится къ этому виду.

### 107. *Enneoctonus collurio* (Linn.).

3480'. 2 ♂ adlt., II/2. VI. 1899, станица Алтайская.  
3480'. ♂ adlt., I/2. VII. 1899, станица Алтайская.

У всѣхъ трехъ птицъ замѣтны слѣды бѣлаго цвѣта у основанія маховъ перваго разряда, скрытые кроющими этихъ маховъ, у одного же экземпляра бѣлое зеркальце это развито особенно рѣзко и едва скрывается кроющими.

Іюньскія птицы еще въ хорошемъ брачномъ нарядѣ, у іюльской же перо значительно уже загрязнилось и обилось, но линять она еще не начала.

Въ дневникѣ П. К. Козловъ отмѣчаетъ, что у станицы Алтайской жуланъ «гнѣздится въ прирѣчной заросли Сарымъ-сакты. Далѣе онъ встрѣчался по верхнему теченію Кобдо и въ долинахъ ея притоковъ Катуня и Уха».

## Сем. *Sylviidae*.

### 108. *Sylvia sylvia* (Linn.).

3480'. 2 ♂ adlt., II/2. VI. 1899, станица Алтайская.  
3480'. ♀ adlt., juv., I/2. VII. 1899, станица Алтайская.

Молодая птица достигла роста взрослыхъ и отличается отъ нихъ только рыхлостью гнѣздового пера.

Въ дневникѣ П. К. Козлова отмѣчено только, что видъ этотъ гнѣздится у Алтайской станицы.

### 109. *Sylvia curruca* (Linn.).

3480'. ♂ adlt., I/2. VII. 1899, станица Алтайская.  
с. 6000'. ♂ adlt., нач. VIII. 1899, верхн. теч. р. Кобдо, Алтай.

У ст. Алтайской наблюдалась «на опушкѣ большого лѣса, состоявшаго изъ лиственницы и кедра и росшаго у подножія горнаго склона, особенно тамъ, гдѣ были лужайки съ кустарными зарослями. На верховьяхъ Кобдо держалась въ густыхъ прибрежныхъ заросляхъ; по утрамъ и вечерамъ пролетала цѣлыми партіями».