

У одной изъ птицъ второй махъ 1-го разряда оканчивается между 6-мъ и 7-мъ; у другой махи повреждены.

110. *Sylvia minuscula* НУМЕ.

9380'. 2 ♂ adlt., 12. IV. 1900, хырма Барунъ-цзасака, юго-вост. Цайдамъ.  
9380'. ♂ adlt., 1/2. V. 1900, хырма Барунъ-цзасака.  
с. 9000'. ♂, ♀ juv. 1-а vest., 1/3. VIII. 1901, юго-вост. Цайдамъ.

У птицъ въ гнѣздовомъ нарядѣ голова совершенно одноцвѣтна со спиной, а не сѣровая.

«Первая пара появилась у хырмы Барунъ-цзасака 27. IV, 1900; на слѣдующій день было замѣчено уже нѣсколько паръ, державшихся по кустарной и камышевой заросли».

? 111. *Sylvia nana* (HEMPH. & ENGB.).

Экземпляровъ этого вида въ коллекціи нѣтъ, но П. К. Козловъ отмѣчаетъ въ дневникѣ, что онъ «наблюдался въ началѣ августѣ 1899 по кустарникамъ въ пустынѣ» на верховьяхъ р. Кобдо (circa 6000').

112. *Acanthopneuste plumbeitarsa* (SWINH.).

с. 14.000'. ♀ adlt., 4—11. VI. 1900, хреб. Амнэнъ-коръ, къ югу отъ Бурханъ-Будды, басс. Желтой р.

Единственный экземпляръ этого вида добытъ въ первые дни іюня 1900 г.

113. *Acanthopneuste viridana* (ВЛУТН.).

3480'. ♂, ♀ adlt., 1/2. VI. 1899, станица Алтайская.

Добыты въ прибрежныхъ заросляхъ Сарымъ-сакты.

114. *Acanthopneuste lugubris* (ВЛУТН.).

с. 13.000'. ♂ adlt., 31. VIII. 1900, рѣч. Чокъ-чю, сист. р. Дзэ-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.

Въ совершенно свѣжемъ перѣ и совершенно закончилъ линяніе.