

Гнѣзовой нарядъ отличается отъ окончательного главнымъ образомъ тѣмъ, что нижняя часть груди и брюха въ немъ не яркаго каштановаго, а черновато-рыжеватаго цвѣта; окраска эта зависитъ отъ тусклого-рыжеватыхъ концовъ рыхлыхъ перьевъ, черезъ которые просвѣчиваетъ черноватая основная часть перьевъ; махи и рули съ блескомъ какъ у старыхъ, но остальные черные участки тѣла тусклаго цвѣта; всѣ перья кромѣ лопаточныхъ съ болѣе или менѣе развитыми рыжеватыми кончиками, а бѣлыя перья верха головы съ черными крапинками; у юльской молодой птицы, рули и махи которой не достигли еще полной длины, черныя перья горла, боковъ шеи и зоба съ лоскомъ и не имѣютъ вовсе рыжихъ кончиковъ, и мнѣ кажется, что это половое отличие самца въ гнѣзовомъ нарядѣ. Съ другой стороны взрослый самецъ ничѣмъ не отличается отъ взрослой самки.

У юльского птенца рули и махи, какъ сказано, еще не отрасли. Августовскій самецъ съ водораздѣла Ды-чю и Меконга еще не линяетъ, но оба самца изъ подъ Синина мѣняютъ мелкое перо, а старый также рули и махи.

«Живетъ по скалистымъ берегамъ рѣчекъ у воды; перебираясь съ камня на камень, громко кричитъ и оригинально мотаетъ хвостомъ. Въ концѣ юля на И-чю водили молодыхъ. Весенній прилетъ замѣченъ на Сэрь-чю у Бана-джунъ 3 апрѣля; сначала появилась одна птица, на другой день добыли вторую, а черезъ недѣлю ихъ было уже порядочно».

125. *Ruticilla frontalis* (VIG.).

- 10.000'. ♂ adlt., 7. IV. 1900, Дуланъ-голь, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хребта.
 12.020'. 2 ♂ adlt., 1/3. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэрь-чю, прит. Дза-чю,
 сист. Голубой р.
 13.200'. ♂ adlt., 22—23. IV. 1901, рѣч. Гэ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
 10.500'. ♂ adlt., II/3. VIII. 1901, кум. Дуланъ-китъ, южн. окр. Южно-Кукунор-
 скаго хребта.
 ♂ adlt., I/2. IX. 1901, Нань-шань.

Августовская птица частью смѣнила уже мелкое перо, а сентябрьская вполнѣ закончила линьку. Свѣжий зимній нарядъ самца отличается отъ брачнаго лишь рыжими кончиками на синихъ перьяхъ головы, зашейка, верхней спины и переда шей.

Въ это путешествіе «была впервые встрѣчена 7. IV въ кустарныхъ заросляхъ рѣчки Дуланъ-голь. Въ прошлое свое путешествіе я наблюдалъ ее только въ густыхъ еловыхъ лѣсахъ одного изъ лучшихъ ущелій, Усугынъ-карагайту, близъ Дуланъ-кита, и полагаю, что горихвостка эта спустилась въ долину по случаю сильныхъ вѣтровъ, сопровождавшихся мя-