

телями и стужей; подтверженіемъ этого предложенія служить и появленіе въ долинѣ Дулань-гола также *Ruticilla alaschanica* и *Lanius giganteus*. Весьма вѣроятно, однако, что снѣжныя бури задержали въ долинѣ недавно прилетѣвшихъ *R. frontalis*. Далѣе П. К. Козловъ самъ замѣчаетъ, говоря про окрестности селенія Бана-джунъ: «замѣчена и добыта 5. IV. 1901 г. одинокая прилетная птица, державшаяся въ арцевыхъ заросляхъ, одѣвающихся южный склонъ горъ».

126. *Ruticilla schisticeps* (HODGS.).

7100'. 4 ♂, ♀ adlt., II. 1900, кум. Чортантанъ, басс. р. Тэтунгъ-голь, Наньшань.

с. 12.000'. 2 ♂ adlt., 2 ♂ juv. mut., ♂ juv. 1-a vest., 1—6. IX. 1900, р. Дзэ-чю, прит. верхн. Меконга.

13.040'. ♀ adlt., III/3. IX. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.

12.020'. 2 ♂ adlt., I/3. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дзэ-чю, сист. Голубой рѣки.

10.500'. ♂ (♀) juv. 1-a vest., I/3. VIII. 1901, кум. Дулань-китъ, южная окраина Южно-Кукунорскаго хр.

Птенцы въ первомъ гнѣздовомъ перѣ легко отличаются отъ гнѣздовиковъ *R. frontalis* тѣми же признаками, что и взрослые самцы и самки, т. е. преобладаніемъ чернаго цвѣта на боковыхъ руляхъ, развитіемъ бѣлаго цвѣта на большихъ и среднихъ кроющихъ крыла и на наружныхъ опахалахъ маховъ 3-го разряда, наконецъ бѣлымъ пятномъ на нижней части шеи, которое въ гнѣздовомъ перѣ намѣчено, но очень неявственно. Самцы и самки отличимы уже въ гнѣздовомъ нарядѣ по хвосту, который въ конечныхъ двухъ третяхъ у самца черный, а у самки бурый.

Молодой, несомнѣнно самецъ, въ гнѣздовомъ нарядѣ, добытый въ первой трети августа 1901 г. у Дулань-кита, еще не началъ смѣнять пера. Изъ пяти птицъ, собранныхъ въ началѣ сентября 1900 г. на р. Дзэ-чю, два взрослыхъ самца, два молодыхъ, смѣнившихъ большую часть гнѣздового пера на окончательное, и одинъ молодой въ почти полномъ гнѣздовомъ нарядѣ, такъ какъ перья окончательнаго наряда начали показываться у него лишь по бокамъ зоба. Изъ взрослыхъ самцовъ одинъ сильно линяетъ, мѣняя какъ мелкое перо, такъ и махи съ рулями, а другой уже окончательно перелинялъ и находится въ совершенно свѣжемъ зимнемъ нарядѣ. Врядъ ли можетъ подлежать сомнѣнію, что молодая птица, лишь начавшая смѣну пера, принадлежитъ ко второму выводку въ то же лѣто и что *R. schisticeps* гнѣздится два раза. Самка съ Баръ-чю въ полномъ зимнемъ нарядѣ. Свѣжій зимній нарядъ самца отличается отъ брачнаго присутствіемъ рыжеватыхъ кончиковъ на синихъ перьяхъ верха головы и затылка, на черныхъ перьяхъ