

137. *Ianthia cyanura rufilata* ВЛҮТН ex HODGS.

12.020'. ♂ juv., 1. IX. 1900, гора Болонго, р. Дза-чю, притокъ Дза-чю (Меконга).

13.040'. ♂ adlt., 22. IX. 1900, уроч. Ярчунъ, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.

11.660'. ♂ adlt., 18. IV. 1901, окр. сел. Санка, р. Дза-чю, прит. Голубой рѣки.

Молодой самецъ — въ первомъ взросломъ нарядѣ, не отличимомъ какъ извѣстно отъ наряда взрослой самки, смѣнилъ уже всѣ мелкія перья за исключеніемъ части гнѣздовыхъ перьевъ на головѣ. Старый, очень интенсивно окрашенный самецъ съ Баръ-чю, въ свѣжемъ осеннемъ нарядѣ, но у него не вполне еще дорасли перья на головѣ. Остатки слѣдовъ линянiя указываютъ на то, что обѣ птицы эти гнѣздились тамъ, гдѣ собраны<sup>1)</sup>.

На Дза-чю убита «на опушкѣ еловаго лѣса»; на Баръ-чю добыта «въ заросли кустарныхъ ивъ (*Salix*) вблизи еловаго лѣса»; на Дза-чю, притокѣ Голубой рѣки «добытъ въ одномъ изъ поросшихъ кустарникомъ боковыхъ ущельицъ Дза-чю повидимому недавно прилетѣвшій на гнѣздовье самецъ».

Отличіе этой формы отъ *I. cyanura* и вообще вопросъ о ея таксономическомъ значеніи сопряжены со значительными трудностями и я долженъ заняться ими тутъ болѣе подробно.

*I. cyanura* гнѣздится во всей таежной области отъ Уральскаго хребта, гдѣ ее нашель между прочимъ К. М. Дерюгинъ въ низовьяхъ Оби, и Алтая до Охотскаго моря, Сахалина, Уссурійскаго края, Кореи и Японіи.

У всѣхъ старыхъ самцовъ, гнѣздящихся въ этой обширной области, надъ темной уздечкой мы видимъ широкую бѣлую полосу, болѣе или менѣе явственные слѣды которой имѣются въ видѣ бѣлыхъ пятнышекъ и на кобальтово-синихъ перышкахъ надглазной полосы; бѣлое треугольное поле, начинающееся своей вершиной на подбородкѣ, а основаніемъ оканчивающееся на нижней части шеи, широкое и занимаетъ всю переднюю сторону шеи, такъ какъ боковыя стороны треугольника совпадаютъ съ линіями, проведенными отъ зѣвковъ къ сгибамъ приложенныхъ къ тѣлу крыльевъ; въ нижней части поле это доходитъ такимъ образомъ до сгиба крыльевъ, а далѣе переходитъ въ такой же бѣлый цвѣтъ зоба, середины груди и брюха. У сѣверныхъ самокъ уздечка и особенно полоска надъ ней много блѣднѣе лба, бѣлое поле на передней сторонѣ шеи обыкновенно такое же

1) Сѣверная *I. cyanura* отлетаетъ несомнѣнно, вылинявши, такъ какъ остается на мѣстахъ гнѣздованія очень долго. Такъ, Ив. С. Поляковъ добылъ на Сахалинѣ въ долину Александровки экземпляръ 6 октября, уже при выпавшемъ снѣгѣ.