

широкое, какъ и у самца, но изрѣдка, какъ напр. у экземпляра, добытаго И. С. Поляковымъ на р. Суйфунъ, и у другихъ, бываетъ довольно узкое; книзу оно ограничено широкимъ грязнымъ рыжевато-оливковымъ поясомъ поперекъ зоба и верхней груди, за которымъ перья середины нижней груди во всей открытой своей части бѣлыя.

У старыхъ самцовъ *I. rufilata*, гнѣздящейся въ Гималаяхъ отъ Гильгита до Сиккима, широкая бровь одноцвѣтная кобальтово-синяя безъ всякихъ слѣдовъ бѣлой полоски надъ уздечкой и далѣе къ заду; бѣлое поле на передней сторонѣ шеи отъ подбородка до зоба узкое, такъ что синій цвѣтъ съ боковъ шеи заходитъ кнутри отъ линій, соединяющихъ зѣвки со сгибами приложенныхъ къ тѣлу крыльевъ; внизу бѣлый цвѣтъ не доходитъ до сгибовъ крыльевъ, а синій образуетъ поперекъ зоба болѣе или менѣе прерванный на серединѣ поясокъ; открытыя части перьевъ зоба и боковъ груди и живота кромѣ самой середины не одноцвѣтныя: бѣлы только концы ихъ, средняя же часть — сѣроватая или сѣрая, но свѣтлѣе, чѣмъ скрытое основаніе перьевъ. У гималайскихъ самокъ уздечка развѣ едва свѣтлѣе лба и блѣдной полоски надъ ней не замѣтно; бѣлое поле на передней сторонѣ шеи узкое, въ видѣ полоски, расширяющейся только на нижней части шеи, но и тутъ очень далеко не доходитъ до сгибовъ крыльевъ; рыжевато-оливковый поясъ на зобу и верхней части груди очень широкъ и теменъ; свѣтлыя перья за нимъ бѣлы только на концѣ, остальная же открытая часть ихъ сѣроватая, за исключеніемъ самой середины груди и живота. Кромѣ того самцы гималайской формы окрашены въ общемъ много интенсивнѣе, чѣмъ сѣверные: ультрамариновый цвѣтъ верха тѣла у нихъ ровнѣе и темнѣе, кобальтово-синій надхвостья гуще. Впрочемъ, интенсивность окраски должна варьировать какъ у *I. rufilata*, такъ и у *I. cyanura*. SCULLY¹⁾ говоритъ, что экземпляры изъ Гильгита блѣднѣе сиккимскихъ, а экземпляръ, добытый Н. М. Пржевальскимъ 4. IV. 1868 на озерѣ Ханка въ Южно-Уссурійскомъ краѣ очень теменъ и навѣрное былъ бы окрашенъ еще интенсивнѣе, если бы былъ въ свѣжемъ осеннемъ нарядѣ. Къ сожалѣнію изъ 12 нашихъ взрослыхъ самцовъ *I. cyanura* въ этомъ нарядѣ нѣтъ ни одного. Но и лѣтнія гималайскія птицы несравненно темнѣе лѣтнихъ сѣверныхъ.

Всѣ перечисленные признаки вполне постоянны съ одной стороны у сѣверныхъ птицъ (*I. cyanura*), а съ другой у гималайскихъ (*I. rufilata*), но на восточной окраинѣ Тибета, отъ юго-восточнаго Нань-шаня до бассейна верхняго теченія Меконга, попадаются птицы съ промежуточными признаками. Къ такимъ птицамъ относится между прочимъ взрослый самецъ,

1) Ibis, 1881, p. 446; Str. Feath., X, p. 116.