

добытый П. К. Козловымъ на Баръ-чю: синій цвѣтъ верхней стороны тѣла у него очень интенсивенъ, сѣроватый цвѣтъ на средней части перьевъ груди и живота вполне явственъ, но на синихъ перьяхъ брови есть скрытыя бѣлыя пятнышки, а бѣлое поле на горлѣ шире, чѣмъ у вполне типичной *I. rufilata*. У молодого самца, находящагося въ нарядѣ самки, съ Дзэ-чю сѣрый цвѣтъ на перьяхъ низа тѣла рѣзокъ, общая окраска темная какъ у *I. rufilata*, но уздечка и полоска надъ ней свѣтлыя, а бѣлое поле на горлѣ очень широкое, какъ у *I. cyanura*. Съ другой стороны старый самецъ съ Дза-чю изъ системы Голубой рѣки вполне типичная *I. rufilata*. Самецъ, добытый Н. М. Пржевальскимъ<sup>1)</sup> въ Гань-су (юго-восточный Нань-шань), очень темень сверху какъ *I. rufilata*, но у него нѣтъ сѣрины на перьяхъ нижней груди и брюха, бѣлое поле на горлѣ широкое, надъ уздечкой рѣзкая бѣлая полоска и замѣтныя снаружи бѣлыя пятна на синихъ перьяхъ брови, такъ что въ общемъ онъ ближе къ *I. cyanura*; самка, добытая тѣмъ же путешественникомъ, окрашена сверху очень темно, на перьяхъ груди и брюха замѣтна сѣрина, бѣлое поле на горлѣ относительно широко, область уздечки свѣтлая, такъ что ее съ одинаковымъ правомъ можно отнести и къ *I. rufilata*, и къ *I. cyanura*. Мы съ М. М. Березовскимъ<sup>2)</sup> отмѣтили, что у типичныхъ въ остальномъ самцовъ *I. rufilata* изъ юго-западной Гань-су имѣются на основаніяхъ перьевъ бровей скрытыя бѣлыя пятнышки.

Наилучшимъ признакомъ для отличія этихъ двухъ формъ является, какъ кажется, цвѣтъ средней части перьевъ нижней груди и живота, а затѣмъ присутствіе или отсутствіе сплошной бѣлой полоски надъ уздечкой; только затѣмъ уже слѣдуютъ интенсивность окраски верха тѣла и ширина треугольнаго бѣлаго поля на горлѣ.

Вѣроятно всѣ эти переходные экземпляры представляютъ результатъ гибридизаціи, идущей на границѣ соприкосновенія областей распространенія двухъ формъ, установить которую весьма трудно именно вслѣдствіе такихъ промежуточныхъ особей. Во всякомъ случаѣ гнѣздованіе типичной *I. cyanura* въ юго-восточномъ Нань-шанѣ подтвердить пока нельзя, такъ какъ собранныя тутъ Пржевальскимъ<sup>3)</sup> въ маѣ *I. cyanura* могли быть и пролетными; съ другой стороны іюльская самка его сбора скорѣе *I. rufilata*. Далѣе, въ бассейнѣ верхняго теченія Голубой рѣки и южнѣе гнѣздится уже только эта послѣдняя, а *I. cyanura* встрѣчается лишь на зимовкѣ. М. М.

1) Плеске, Научн. рез. пут. Пржевальскаго, II, стр. 76—77.

2) Aves Exped. Potanini, p. 80.

3) Плеске, Научн. рез. пут. Пржевальскаго, II, стр. 76—77.