

Березовскій<sup>1)</sup> говоритъ, что *I. cyanura* въ ю.-з. Гань-су рѣдка и замѣщается тутъ *I. rufilata*, которая вѣроятно только гнѣздится. Онъ нашелъ ее здѣсь въ округахъ гг. Минь-чжоу (дер. Ю-дзань-пу, VIII) и Сигу-чэнь (дер. Лото-пинъ, VII, и Лотани, IX). Изъ центральной части Сы-чуани приводитъ ее ОУСТАЛЕТ<sup>2)</sup> на основаніи экземпляровъ, добытыхъ принцемъ Г. Орлеанскимъ и Бонвало въ Да-дзянь-лу и въ недалеко отъ послѣдняго лежащемъ Tongolo. Въ высшей степени вѣроятно, что самка, названная ОГИЛВИЕ-ГРАНТ'омъ<sup>3)</sup> *I. cyanura* и добытая 25. I. въ Pu-an-tug въ юго-западной части пров. Гуй-чжоу (Kwei-tschou), относится къ *I. rufilata*. Далѣе къ востоку въ Китаѣ видъ этотъ не находили. На Тибетскомъ нагорьѣ, въ Камѣ, его добылъ теперь П. К. Козловъ въ бассейнахъ верхняго теченія рѣкъ Голубой и Меконга. Отсюда онъ долженъ распространяться въ Гималаи, по которымъ онъ идетъ далѣе до Кашмира и Гильгита, гнѣздясь на высотѣ 6.000—16.000' и спускаясь ниже зимою. Повидимому исключительно въ холодное время года *I. rufilata* встрѣчается въ Khási-hills, Tipperah, Manipur'ѣ<sup>4)</sup> и южной части Shan-states<sup>5)</sup> въ Верхней Бурмѣ.

Такимъ образомъ видъ этотъ долженъ считаться типичнымъ гималайскимъ; онъ свойственъ горнымъ хвойнымъ лѣсамъ.

*I. cyanura* — форма восточно-азиатская, но распространившаяся, вѣроятно недавно, по всей Сибири до Уральскаго хребта. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ Пермской губ. нашелъ ее весьма обыкновенной птицей Л. П. Сабанѣевъ, а въ низовьяхъ Оби — К. М. Дерюгинъ. Если не считать залетныхъ птицъ, изрѣдка добывавшихся подъ Оренбургомъ Н. А. Заруднымъ, то окажется, что сивохвостка не встрѣчается ни въ юго-западной Сибири до Алтая, ни въ Туркестанѣ. Птицы, обильно гнѣздящіяся на восточномъ склонѣ Урала, лѣтятъ слѣдовательно на зимовку на востокъ. Въ западной Монголіи на пролетѣ она, насколько мнѣ извѣстно, не найдена, но всюду обыкновенна въ это время въ восточной Монголіи и Манджуріи; Пржевальскій нашелъ ее на пролетѣ въ землѣ Уротовъ (ю. Гоби), въ Алашаньскомъ хребтѣ, въ юго-восточномъ Нань-шанѣ (Гань-су) и на р. Номохунь-голь въ хребтѣ Бурханъ-Будда; послѣдній представляетъ самое юго-западное изъ извѣстныхъ мѣстонахожденій ея. Въ бассейнѣ верховьевъ Голубой рѣки М. М. Березовскій добылъ всего одинъ экземпляръ въ срединѣ октября

1) Aves Exped. Potanini, p. 80.

2) Nouv. Arch. Mus. Paris, (3) V, 1893, p. 165.

3) Ibis, 1900, p. 595.

4) OATES, Faun. Brit. India, Birds, II, p. 104.

5) BINGHAM, Ibis, 1903, p. 598; RIPPON, Ibis, 1901, p. 544; OATES, Ibis, 1894, p. 483.