

I. hyperythra синій, какъ у *I. cyanura* и *I. rufilata*, а у *I. indica* оливково-бурый безъ всякихъ слѣдовъ синяго.

Распознаваніе формъ рода *Ianthia* можетъ быть облегчено при помощи слѣдующей синоптической таблички.

- 1 (2) Перья верха тѣла и большей части нижней стороны тѣла въ характерныхъ для гнѣздового наряда свѣтлыхъ наствольяхъ: Juv. 1-a vest.
Птенцы *I. indica* и *I. hyperythra* неизвѣстны, но первые отличаются отъ всѣхъ остальныхъ по всей вѣроятности отсутствіемъ синяго или голубого цвѣта на внѣшнихъ опахалахъ рулей.
 - 2 (1) Перья верха и низа тѣла безъ свѣтлыхъ наствольевъ.
 - 3 (10) Преобладающій цвѣтъ верха тѣла оливковый; синій и голубой только на надхвостьѣ и хвостѣ, а иногда (*I. indica*) и тутъ его нѣтъ; на крыльяхъ тоже никогда нѣтъ синяго: ♀ adlt. и ♂ juv. 2-a vest.
 - 4 (9) Верхнія кроющія хвоста и наружное опахало рулей болѣе или менѣе голубыя или синія. Широкой свѣтлой брови кзади отъ глаза нѣтъ.
 - 5 (8) Оранжевыя или ярко-охристыя перья лишь по бокамъ груди, въ рѣзкомъ контрастѣ съ остальнымъ низомъ тѣла.
 - 6 (7) Перья всей средней части нижней груди и живота въ открытыхъ своихъ отдѣлахъ бѣлыя, безъ сѣрины; бѣлое поле на передней сторонѣ шеи широкое, въ видѣ треугольника, боковыя стороны котораго совпадаютъ съ линіями, проведенными отъ зѣвковъ къ сгибамъ крыльевъ; область уздечки значительно свѣтлѣе верха головы; оливково-бурая окраска верха тѣла и зоба свѣтлѣе; синій цвѣтъ на руляхъ обыкновенно свѣтлѣе.
- I. cyanura.***
- 7 (6) Нижняя часть груди и брюхо, за исключеніемъ самой середины ихъ, съ сѣриной, происходящей отъ того, что перья бѣлы только на концахъ, а въ своей средней, открытой еще части сѣроваты; бѣлое поле на передней сторонѣ шеи узкое, такъ что оливковый цвѣтъ боковъ шеи заходитъ за линіи, соединяющія зѣвки со сгибами крыльевъ; область уздечки почти одноцвѣтна съ верхомъ головы; оливково-бурая окраска верха тѣла и зоба очень темная; синій цвѣтъ на руляхъ интенсивный.
- I. cyanura rufilata.***
- 8 (5) Рѣзкаго оранжеваго или ярко-охристаго пятна на бокахъ груди нѣтъ, такъ какъ рыжевато-бурая окраска всего низа тѣла становится тутъ лишь нѣсколько гуще.
- I. hyperythra.***
- 9 (4) Верхнія кроющія хвоста и наружное опахало рулей оливково-бурья, безъ всякаго слѣда синевы. Широкая, частью скрытая свѣтлая бровь.
- I. indica.***
- 10 (3) Преобладающій цвѣтъ верха тѣла ото лба до крыльевъ и хвоста синій, различныхъ оттѣнковъ: ♂ adlt.
 - 11 (14) Находящееся въ рѣзкомъ контрастѣ съ остальной окраской низа тѣла оранжевое пятно только на бокахъ тѣла; горло бѣлое, середина груди и живота бѣлая или сѣроватая, а не рыжевато-оранжевая. Нижнія кроющія крыла и подмышечныя бѣлыя или сѣроватыя.
 - 12 (13) Вся нижняя часть груди и животъ бѣлые, безъ сѣрины; надъ темной уздечкой сплошная и широкая бѣлая полоска, переходящая въ прерванную, которая образована бѣлыми пятнышками на голубыхъ перышкахъ брови; треугольное бѣлое поле, вершиной приходящее на подбородокъ, а основаніемъ граничащее съ зобомъ, широкое, такъ что бока треугольника совпадаютъ съ линіями, проведенными отъ зѣвковъ къ сгибамъ приложенныхъ къ тѣлу крыльевъ; синій цвѣтъ верха тѣла менѣе интенсивный.
- I. cyanura.***
- 13 (12) Нижняя часть груди и животъ кромѣ самой середины ихъ съ сѣриной, зависящей отъ окраски средней, но обнаженной части перьевъ, лишь концы