

которыхъ бѣлые; сплошной бѣлой полосы надъ уздечкой и ея продолженія къзади нѣтъ или только слѣды ихъ въ видѣ пятнышекъ на голубыхъ перьяхъ брови; треугольное бѣлое поле на передней сторонѣ шеи узкое, стѣсненное синимъ цвѣтомъ, заходящимъ съ боковъ шеи за линіи, соединяющія зѣвки со сгибами крыльевъ; синій цвѣтъ верха тѣла очень интенсивенъ и сплошной.

I. cyanura rufilata.

14 (11) Оранжевые бока тѣла почти одноцвѣтны съ рыжевато-оранжевыми подбородкомъ, горломъ, зобомъ, грудью и брюхомъ, изъ которыхъ двѣ послѣднія части тѣла бѣлы только въ самой серединѣ. Нижнія кроющія крыла и мышечныя оранжевыя.

15 (16) Бровь синяя; всѣ перья крыла съ синими каймами; верхъ тѣла индигово-синій.

I. hyperythra.

16 (15) Широкая и очень длинная бровь бѣлаго цвѣта; наружныя кроющія крыла и большая часть маховыхъ съ желтовато-бурыми каймами, внутреннія и махи 3-го разр. съ сѣро-синими; верхъ тѣла сѣро-синій.

I. indica.

138. *Pratincola maura maura* (PALL.).

3480'. 2 ♂ adlt., juv. 1-a vest., II/2. VII. 1899, станица Алтайская.
с. 5500'. 2 ♂, ♀ adlt., 3—4. VIII. 1899, средн. теч. р. Кобдо, Алтай.

Взрослые самцы изъ станицы Алтайской въ сильно поношенномъ лѣтнемъ нарядѣ и не начали еще линять, а всѣ три птицы съ Кобдо совершенно уже перелиняли и въ полномъ осеннемъ нарядѣ.

Длина крыла у ♂ adlt. 69.0, 68.0, 72.0 и 69.5, у ♀ adlt. 70.0 и у juv. 68.0 mm.

139. *Pratincola maura przewalskii* PLESKE.

с. 13.000'. Jun. 1-a vest., 13—21. VII. 1900, рѣч. Хи-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.

12.090'. ♂, 2 ♀ juv., 9—20. VIII. 1900, кум. Чжерку на рѣч. Дза-чю, прит. Цзанъ-да, сист. Ды-чю.

12.020'. 4 ♂ adlt., 1/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.

с. 12.000'. ♂ jun., II/3. VIII. 1901, Южно-Кукунорскій хребетъ.

Длина крыла у птицы въ гнѣздовомъ нарядѣ равна 71.5, у ♂ jun. 75.5 и 72.0, у ♀ jun. 72.5 и 72.0, у ♂ adlt. 76.0, 73.0 72.0 и 71.0 mm.

Молодая птица съ Хи-чю въ гнѣздовомъ нарядѣ, который она не начала еще мѣнять. Птицы изъ Чжерку почти кончаютъ смѣну гнѣздового пера на окончательный: у двухъ отдѣльных гнѣздовыхъ перья остались только на бокахъ шеи и верха головы, у третьей ихъ еще много на верхѣ головы, зашейкѣ, межлопаточной области и бокахъ шеи. Молодой самецъ съ Южно-Кукунорскаго хребта въ полномъ осеннемъ нарядѣ.

«Весною 1901 г. первыя птицы, быстро пролетавшія парочки, были замѣчены 25 марта близъ озера Юлюнь-мцо» въ верховьяхъ рѣчки И-чю, впадающей въ Дза-чю, притокъ Голубой рѣки. Затѣмъ «одиночная птица