

встрѣчена 28 марта въ урочищѣ Суру-нанъ у южнаго подножія перевала Гонъ-ла, гдѣ держалась въ ущельи, поросшемъ кустарникомъ». Въ первой половинѣ апрѣля была уже обильна у Бана-джунъ, какъ доказываютъ четыре убитыхъ тутъ самца.

Всѣ птицы рѣзко отличаются окраской отъ добытыхъ въ Алтай *Pr. taiga* и вполне типичны. Вопросъ о формахъ *Pr. taiga* много сложнѣе, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда, и нуждается въ специальной разработкѣ, а потому тутъ я не буду его касаться. Возможно, что *Pr. przewalskii* окажется формой, свойственной исключительно восточной окраинѣ Тибетскаго нагорья въ обширномъ смыслѣ послѣдняго слова и верхнимъ поясамъ восточной половины Гималаевъ и что крупныя птицы западной окраины Тибета относятся не къ нему.

#### 140. *Saxicola pleschanka* (ЛЕРЕСН.).

- 3480'. ♀ adlt., II/2. VII. 1899, станица Алтайская.  
с. 5500'. ♂ adlt., 3—4. VIII. 1899, средн. теч. р. Кобдо, Алтай.  
8700'. ♂ adlt., 23. III. 1890, кум. Дацанъ-сумэ, юго-вост. Нанъ-шанъ.

Самка въ сильно изношенномъ нарядѣ, но линять еще не начала. Самецъ съ Кобдо въ совершенно свѣжемъ и полномъ зимнемъ нарядѣ уже безъ всякихъ признаковъ линія. У мартовскаго самца большинство перьевъ верха головы съ бурыми кончиками, но зашеекъ много бѣлѣе.

У кумирни Дацанъ-сумэ «наблюдалась одиночная пролетная птица».

#### 141. *Saxicola deserti* ТЕММ.

- с. 7000'. ♂ adlt., 6. VIII. 1899, долина р. Уха, прит. Кобдо, Алтай.  
с. 7220'. ♂ adlt., 9—14. IX. 1899, уроч. Тангутъ-тологой, зап. берег. озер. Хулму-норъ, Гобійскій Алтай.  
с. 6500'. 2 ♂ (1 ♀) adlt., 16—17. IX. 1899, уроч. Такилантынъ-булыкъ, при оз. Тунъ-куль, Гобійскій Алтай.  
с. 4000'. ♂ adlt., I/2. X. 1901, Ала-шанъ.

Августовскій самецъ въ общемъ уже въ осеннемъ нарядѣ, но всѣ еще перья, какъ часть мелкаго, такъ и рули съ махами, частью дорастаютъ; не смѣнена только часть перьевъ на горлѣ. Сентябрьскія и октябрьскія птицы совсѣмъ уже перелиняли.

«У озеръ Хулму-норъ и Тунъ-куль наблюдался пролетъ парами».

#### 142. *Saxicola montana* (GOULD).

- 10.790. ♂ adlt., 4. IV. 1900, оз. Цаганъ-норъ, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хребта.  
10.000'. 2 ♂ adlt., 5—6. IV. 1900, кум. Дуланъ-китъ на рѣч. Дуланъ-голь, южн. окр. Южно-Кукунорскаго хрб.