

146. *Accentor collaris tibetanus* BIANCHI,

Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. St.-Petersb., IX, 1904, p. 128.

10.660—16.040'. ♂, ♀ adlt., II/2. V. 1900, сѣв. склонъ хребта Бурханъ-Будда, бассейнъ Желтой рѣки.

15.780'. ♂, ♀ adlt., 19. XI. 1900, перев. Цара-ла, къ сѣв. отъ р. Рэ-чю, лѣваго прит. Меконга.

*Accentor* rectricibus maculis pallidis apicalibus distincte circumscriptis ornatis; dorso maculato; alâ sat acuminata, caudâ multo longiore; tectricibus superioribus alae distinctissime maculis albis apicalibus ornatis. — Plumis ingluviei fere unicoloribus griseis, haud fulvis vel cinnamomeis albo marginatis; tectricibus majoribus remigum secundi ordinis pogonio externo nigro solummodo macula apicali alba ornato, sed non fulvo marginato; vitta superciliari obsoleta; — uropygio praevalente fulvo colorato; plumis dorsalibus fulvo, haud ferrugineo, nec cinnamomeo marginatis, maculis centralibus latissimis nigrescentibus vel nigris; ingluvie grisea vel cinerea, haud brunnescente; plumis cinnamomeis laterum pectoris superioris distincte albo marginatis.

Я выдѣляю форму *Accentor*, свойственную Тибету, въ особый подвидъ, *Accentor collaris tibetanus*, который ближе всего къ *Ac. collaris erythrorugius*, живущей въ хребтахъ Гоби и крайнихъ хребтахъ южной Сибири. *Ac. tibetanus* имѣетъ, какъ и эта послѣдняя, явственные бѣлые ободки на коричневыхъ перьяхъ боковъ верхней груди, но отличается отъ *Ac. erythrorugius* рыжимъ, а не коричневымъ верхомъ тѣла кзади отъ зашейка, болѣе свѣтлымъ оттѣнкомъ сѣраго цвѣта верха головы, зашейка и особенно зоба и большимъ развитіемъ черныхъ наствольевъ на спинѣ, что сближаетъ ее съ *Ac. nepalensis*. Черныя настволья эти развиты особенно сильно у *Ac. tibetanus* съ восточной окраины Тибета, такъ что въ обношенномъ лѣтнемъ нарядѣ на спинѣ у нихъ преобладаетъ черный цвѣтъ, какъ у *Ac. nepalensis*; тѣмъ не менѣе даже эти птицы легко отличаются отъ послѣдней формы по крайней мѣрѣ явственными слѣдами бѣлыхъ ободковъ на перьяхъ боковъ верхней груди, которыхъ у *Ac. nepalensis* нѣтъ, по крайней мѣрѣ слѣдами рыжаго цвѣта, а не коричневаго какъ у *Ac. nepalensis*, на краяхъ перьевъ спины и значительно болѣе свѣтлымъ оттѣнкомъ сѣраго цвѣта на верхѣ головы, зашейкѣ и особенно на зобу. Отъ *Ac. collaris collaris* и *Ac. collaris rufilatus* тибетская завирушка легко отличается преобладаніемъ рѣзко рыжаго, а не сѣраго или соловаго цвѣта, какъ у тѣхъ, на надхвостьѣ; отъ *Ac. rufilatus* кромѣ того бѣлыми ободками на коричневыхъ перьяхъ боковъ верхней груди.

У взрослога самца въ зимнемъ нарядѣ (перев. Цара-ла, басс.