

верхн. Меконга, 19. XI. 1900), верхъ головы, зашеекъ и нижняя часть боковъ шеи буровато-сѣраго цвѣта, тономъ свѣтлѣе, чѣмъ у *Ac. erythropygus*, на головѣ въ неявственныхъ темныхъ наствольяхъ; перья межлопаточной области и нижней спины черновато-бурья въ срединѣ до самой вершины съ широкими рыжеватыми или соловыми краями; лопаточныя на наружномъ опахалѣ коричневыя, на внутреннемъ рыжія съ черновато-бурымъ наствольемъ, не достигающимъ до конца пера; надхвостье рыжее безъ коричневаго оттѣнка; верхнія кроющія хвоста коричневыя съ блѣдными рыжими ободками и узкими черноватыми наствольями, которыя однако широки на самыхъ длинныхъ перьяхъ; рули буровато-черныя на обоихъ опахалахъ, съ узкими рыжеватыми ободками, которые на концѣ вдругъ расширяются и доходятъ до стержня пера на обоихъ опахалахъ средней пары руля, но только на наружномъ у остальныхъ паръ, гдѣ конецъ внутренняго опахала занятъ рѣзко ограниченнымъ бѣлымъ пятномъ, опоясаннымъ вдоль проксимальной своей окружности рыжеватымъ; малыя кроющія крыла буровато-сѣрыя со слабымъ соловымъ оттѣнкомъ, среднія и большія въ открытыхъ своихъ частяхъ черныя съ рѣзко ограниченными бѣлыми пятнами на вершинѣ; внутреннія изъ большихъ кроющихъ съ широкой рыжевато-сѣровой каймой въ основной части наружнаго опахала; махи буровато-черныя, не покрытыя части ихъ черныя, всѣ махи съ рыжими каймами, которыя узки на махахъ перваго разряда и расширяются на махахъ второго и особенно третьяго разряда, а на концахъ переходятъ въ рыжее пятно, которое на своей вершинѣ бѣлое; внутреннее опахало маховъ 1-го разр. сѣровато лишь въ основной части, маховъ 2-го разряда по всей своей длинѣ и образуетъ ободокъ и на вершинѣ ихъ, а маховъ третьяго разряда блѣдно-коричневое; перья уздечки черновато-бурья съ бѣловатыми кончиками; надъ глазомъ слабо замѣтная бѣлесовато-сѣрая бровь; ушныя бурья со слабымъ соловымъ оттѣнкомъ; верхняя часть боковъ шеи сѣрая съ болѣе явственнымъ соловымъ оттѣнкомъ; перья подбородка, горла и нижней части переда шеи въ скрытой основной части сѣрыя, а въ конечной темно-бурья съ широкой бѣлой перевязью передъ вершиной; зобъ сѣраго цвѣта, какъ зашеекъ, со слабымъ соловымъ оттѣнкомъ; бока груди и живота въ коричневыхъ перьяхъ съ бѣлыми краями, которые къ заду тѣла становятся шире; перья середины нижней груди и живота рыжеватыя съ бѣлыми кончиками; нижнія кроющія хвоста каштановыя съ длинными бѣлыми концами; перья голеней солово-сѣрыя; нижнія кроющія крыла рыжеватыя съ бѣловатымъ концомъ и бурой тѣнью передъ нимъ на наружномъ опахалѣ; подмышечныя сѣроватыя съ соловымъ оттѣнкомъ особенно на концахъ; перья по краю крыла черны съ бѣлыми ободками на концѣ. Клювъ черный, у осно-