

ванія обѣихъ челюстей, особенно нижней, желтый; ноги темно-рыжаго цвѣта, пальцы темные, когти черновато-рогового цвѣта. Culmen 17.0, обнаженный 13.0, отъ передняго конца ноздри 9.5; крыло 103.5; хвостъ 78.0; плюсна 26.0 mm.

Взрослая самка въ зимнемъ нарядѣ (перев. Цара-ла, басс. верхн. Меконга, 19. XI. 1900) не отличается отъ самца. Culmen 17.0, обнаженный 13.0, отъ передняго конца ноздри 9.5; крыло 97.0; хвостъ 70.0; плюсна 25.0 mm.

Взрослые птицы въ лѣтнемъ нарядѣ ( $\delta$  и  $\varphi$ , V. 1900, хреб. Бурханъ-Будда) отличаются отъ птицъ въ зимнемъ нарядѣ очень мало, именно нѣсколько большей блѣдностью всѣхъ цвѣтовъ и главнымъ образомъ большими или меньшими исчезновеніемъ краевыхъ частей перьевъ, что сказывается особенно сильно на межлопаточной области и нижней спинѣ, гдѣ отъ рыжаго цвѣта остаются лишь слѣды. Culmen  $\delta$  17.0,  $\varphi$  17.0, обнаженный  $\delta$  13.5,  $\varphi$  13.5, отъ ноздри  $\delta$  9.75,  $\varphi$  9.5; крыло  $\delta$  104.5,  $\varphi$  102.0; хвостъ  $\delta$  76.0,  $\varphi$  75.5; плюсна  $\delta$  26.0,  $\varphi$  25.5 mm.

Птица въ гнѣзовомъ перѣ съ невполнѣ еще отросшими рулями и махами (Пржевальскій, восточный Нань-шань, VII. 1880). Верхъ головы и задъ шеи сѣровато-бурый съ соловымъ оттенкомъ, перья безъ темныхъ наствольевъ; перья межлопаточной области и нижней спины рыжевато-соловыя съ бурымъ наствольемъ, доходящимъ до конца пера; лопаточные рыжія, на наружномъ опахалѣ интенсивнѣе, въ неявственныхъ темныхъ наствольяхъ; надхвостье рыжевато-соловое безъ наствольевъ; верхнія кроющія хвоста рыжія, всѣ въ широкихъ бурыхъ наствольяхъ; рули и всѣ перья крыла окрашены какъ у взрослыхъ, но вершинныя пятна на внутреннемъ опахалѣ рулей рыжія, на среднихъ и большихъ кроющихъ крыла соловыя, а не бѣлыя; соловая бровь выражена чуть рѣзче, чѣмъ у взрослыхъ птицъ; перья горла свѣтло-бурыя въ неявственныхъ бѣловато-соловыхъ перевязяхъ передъ концомъ; перья зоба, боковъ тѣла и подхвостья рыжеватыя съ болѣе или менѣе явственными бурыми наствольями, которыхъ нѣть на срединѣ нижней груди и на животѣ, имѣющихъ соловую окраску. — Отъ взрослыхъ птицъ кромѣ характерной рыхлости пера, тусклости всѣхъ цвѣтовъ и меньшей явственности рисунка на горлѣ отличается бурыми наствольями на перьяхъ зоба и боковъ тѣла, а также отсутствиемъ каштановаго цвѣта на бокахъ тѣла и на нижнихъ кроющихъ хвоста. Характерный для гнѣзовиковъ пятнистый нарядъ сохранился такимъ образомъ только на зобу и бокахъ тѣла.

*Ac. tibetanus* свойственна восточной окраинѣ Тибетскаго нагорья въ обширномъ смыслѣ слова и распространена отъ восточнаго Нань-шаня до