

этихъ рѣчекъ, держалась среди кустарниковъ и зарослей, часто на землѣ, иногда въ сосѣдствѣ съ *Carpodacus*, *Ruticilla* и *Emberiza*. Голосъ ея дребезжащій, звонкій, слышенъ на далекое разстояніе.

«Въ долинѣ рѣчки Сэръ-чю держалась на склонахъ ея, гдѣ пряталась въ вѣтвяхъ древеснаго можжевельника, но летала кормиться также и на пашни, расположенныя на днѣ ущелья.

«Въ верховьяхъ рѣчки Натунъ-чю, на высотѣ свыше 13.000', была рѣдка и держалась въ кустарникахъ сѣвернаго склона горы».

149. *Prunella rubeculoides* (MOORE).

6610'. ♂ adlt., 23. I. 1900, г. Гу-ланъ-сянь, сѣв. поднож. Нань-шаня.

10.660—16.040'. 2 ♀ adlt., II/2. V. 1900, сѣв. склонъ, хрб. Бурханъ-Будда, бассейнъ Желтой рѣки.

с. 14.000'. ♀ adlt., 10. VI. 1900, хрб. Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.

13.730'. pull., I/4. VIII. 1900, оз. Рхомбо-мцо, верхов. р. И-чю, прит. Голубой рѣки.

11.960'. ♂ adlt., XII. 1900, Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

12.020'. ♀ adlt., I/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на рѣч. Сэръ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.

с. 14.000'. Гнѣздо съ 3 яйц., 10. VI. 1900, хребетъ Амнэнъ-коръ, басс. Желтой рѣки.

У птенца, добытаго на озерѣ Рхомбо-мцо, рули отрасли лишь на половину.

Въ сѣверо-восточномъ Нань-шанѣ добыта у Гу-ланъ-сяня, судя по замѣткѣ въ дневникѣ, указывающей что экземпляръ этотъ собранъ тамъ же, гдѣ *R. alaschanica*. «Одиночная птица сидѣла утромъ на тополѣ въ китайскомъ селеніи.

«Въ хребтахъ Бурханъ-Будда и Амнэнъ-коръ видъ этотъ сталъ встрѣчаться часто. Въ послѣднемъ найдено гнѣздо, при которомъ добыта самка, въ ущельи сѣвернаго склона, поросшаго кустарникомъ, на южной границѣ растительности. Гнѣздо помѣщалось уже на луговой землѣ около камня въ ямкѣ». Непосредственно къ ямкѣ примыкалъ очевидно довольно толстый слой тонкой бѣлой и соловой шерсти, частью скомканной, частью же уложенной прядями, которая составляетъ наружное дно гнѣзда. Стѣнки гнѣзда, имѣющія съ одной стороны 15, а съ другой 20 мм. толщины, выстроены изъ зеленаго мха, повидимому съ примѣсью стебельковъ травъ. Самый лоточекъ состоитъ изъ бѣлой шерсти какого-то вида оленей и небольшого количества черныхъ волосъ. Наружный діаметръ гнѣзда равенъ 10.5, внутренній около 7.5 см., высота около 4.5 см., глубина лоточка около 2 см. Въ гнѣздѣ находились три значительно насиженныхъ яйца, такъ что кладка была очевидно окончена. Судя по величинѣ зародыша въ разбитомъ яйцѣ,