

насиживание продолжалось около недели. Цветъ яицъ зеленовато-голубой, почти какъ у *Prunella modularis*. Вѣсъ яицъ опредѣлить нельзя. Размѣры двухъ цѣлыхъ яицъ слѣдующіе:

	Длина.	Ширина.
a.	20.5 mm.	14.5 mm.
b.	21.5 »	14.5 »

### 150. *Prunella kozlowi* (PRZEW.).

с. 4000'. ♂, ♀ adlt., 17. X. 1901, кол. Сайрэнъ-худукъ въ горахъ Цзунъ-Цохонъ-шилъ, центральная Гоби къ югу отъ Гобійскаго Алтая.

Обѣ птицы въ свѣжемъ зимнемъ нарядѣ; длина крыла самца 69.0, самки 68.0 mm.

На оригинальной этикеткѣ помѣчены «Ала-шань, октябрь 1901 г.», но справка въ оригиналѣ маршрута экспедиціи приводитъ меня къ убѣжденію, что птицы добыты 17. X. 1901 г. близъ колодца Сайрэнъ-худукъ у подножія горъ Цзунъ-Цохонъ-шилъ, въ центральной Гоби приблизительно на градусъ (с. 40°25' сѣв. шир. и 103°46' в. д. отъ Гринв.) южнѣе Гобійскаго Алтая.

Въ орнитологическомъ дневникѣ П. К. Козлова замѣтокъ объ этомъ интересномъ видѣ нѣтъ.

### 151. *Aprunella immaculata* (HODGS.).

11.960'. ♂ adlt., 1/3. I. 1901, Рэ-чю, лѣвый прит. Меконга.

Единственный экземпляръ «былъ добытъ изъ пары, державшейся у ручья въ густомъ хвойномъ лѣсу ущелья рѣчки Рэ-чю. Голосъ этого вида напоминаетъ голосъ *Ruticilla*».

## Сем. *Cinclidæ*.

### 152. *Cinclus przewalskii* BIANCHI,

Bull. Brit. Orn. Club., XV, 1905, p. 91.

с. 15.000'. a. ♂ adlt., 3. III. 1901; верх. рѣч. Го-чю, прит. верхн. Гэ-чю, сист. Дзэ-чю, прит. верхн. Меконга.

11.660'. b. ♂ adlt., 17—18. IV. 1901, рѣч. Дэнъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.

Обѣ птицы старья.

Эта оляпка представляетъ рѣзкій видъ, отличающійся отъ всѣхъ остальныхъ формъ съ темнымъ низомъ тѣла тѣмъ, что перья нижней спины