

Размѣры восьми пока извѣстныхъ экземпляровъ *C. przewalskii* слѣдующіе:

	Крыло.	Culmen.	Оголенный culmen.	Хвостъ.	Плюсна.
a. ♂ adlt. .	97.0 mm.	21.0 mm.	16.0 mm.	62.5 mm.	27.2 mm.
b. ♂ adlt. .	91.5 »	21.5 »	16.5 »	64.5 »	30.0 »
c. ♂ adlt. .	87.0 »	21.0 »	16.0 »	57.0 »	27.5 »
d. ♂ adlt. .	96.0 »	22.0 »	16.0 »	62.0 »	29.5 »
f. ♂ adlt. .	92.5 »	21.0 »	16.5 »	60.0 »	29.0 »
h. ♂ adlt. .	98.0 »	22.5 »	17.0 »	60.0 »	27.5 »
g. ♀ adlt. .	87.0 »	21.0 »	15.5 »	56.5 »	29.0 »
e. adlt. .	93.5 »	20.5 »	16.0 »	59.5 »	29.0 »

Весьма вѣроятно, что полъ нѣкоторыхъ экземпляровъ помѣченъ неправильно.

Экспедиція П. К. Козлова нашла эту оляпку «въ значительномъ числѣ» по верхнему теченію рѣки Гэ-чю, впадающей въ Меконгъ, и по ея правому притоку, рѣчкѣ Го-чю, спускающейся по южному склону водораздѣльнаго хребта между бассейнами Меконга и Голубой рѣки. «Въ началѣ марта она отлично пѣла и держалась вмѣстѣ съ *C. cashmeriensis* по краямъ тающаго льда». Въ половинѣ апрѣля того же года она встрѣчена на рѣчкѣ Дэнъ-чю, притокѣ рѣки Дза-чю, относящейся къ системѣ Голубой рѣки.

Остальные наши матеріалы доказываютъ, что *C. przewalskii* распространяется отсюда къ сѣверу по всей восточной окраинѣ Тибета и чрезъ бассейнъ Желтой рѣки (хребетъ Бурханъ-Будда) проникаетъ на сѣверную окраину Тибетскаго плато до подножія хребта Марко-Поло. Къ востоку ее можно прослѣдить пока до деревни Лотани въ Сигучэнскомъ округѣ южной части провинціи Гань-су, гдѣ ее нашелъ въ 1885 г. М. М. Березовскій¹⁾. Въ восточной, болѣе низменной части Гань-су путешественникъ этотъ ее не нашелъ и тутъ она замѣщается повидимому *C. souilei*²⁾. Весьма трудно рѣшить, къ какому виду относится темная оляпка, наблюдавшаяся Пыльцовымъ въ Южно-Тетунгскомъ хребтѣ восточнаго Нань-шаня³⁾.

На основаніи вышесказаннаго можно установить слѣдующую синониміку *C. przewalskii*:

Hydrobata sordida (non GOULD) PRZEWALSKI, Монг. и стр. Тангут., II, Птицы, стр. 65 (1876); in ROWLEY'S Orn. Misc., II, p. 202 (1877). DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 539 (1877, part.).

Cinclus sordidus (non GOULD) PLESKE, Wiss. Res. Przew. Reis., II, p. 31 (1889). BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves exped. Potanini, p. 102 (1891). KOZLOW in Роборовскій, Труд. экспед. Центр. Азии 1893—1895, II, p. 282 (1899).

1) *C. sordidus* apud BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves exped. Potanini, p. 102.

2) *C. pallasi* apud BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves exped. Potanini, p. 103.

3) *C. sordidus* apud PLESKE, Wiss. Res. Przew. Reis., II, p. 31.