

Ближайшая родственница *C. przewalskii* описана д-ромъ Н. WALTON'омъ<sup>1)</sup> какъ разъ во время моего пребыванія въ Лондонѣ, такъ что я имѣлъ возможность, пользуясь любезностью автора, сравнить ее съ моимъ видомъ. Форма эта, названная *Cinclus younghusbandi*, имѣетъ точь-въ-точь такую же окраску задней части межлопаточной области, нижней спины, надхвостья, верхнихъ кроющихъ хвоста, лопаточныхъ и малыхъ кроющихъ крыла, какъ у *C. przewalskii*, но отличается отъ нея нѣсколько болѣе свѣтлой окраской вообще всего тѣла, а главное присутствіемъ сѣроватаго оттѣнка на верхѣ головы, зашейкѣ, прилежащей къ послѣдней части межлопаточной области, подбородкѣ, горлѣ и зобѣ; нижняя часть груди и брюхо у *C. younghusbandi* со слабо выраженнымъ черноватымъ оттѣнкомъ, какъ у нѣкоторыхъ особей *C. przewalskii*. Длина крыла трехъ экземпляровъ, всѣхъ самокъ, равняется 91, 89 и 89 мм. Всѣ три эти птицы добыты въ октябрѣ и ноябрѣ 1903 г. въ Камба Jong, у сѣвернаго подножія Гималая на границѣ Сиккима. Я считаю эту форму по большей мѣрѣ подвигомъ *C. przewalskii*.

*Cinclus sordidus* GOULD, съ которой смѣшивалась до сихъ поръ *C. przewalskii*, тотчасъ же отличается отъ этой послѣдней и отъ *C. younghusbandi* бурными малыми кроющими крыла, лопаточными и нижней спиной, бурными съ сѣроватымъ оттѣнкомъ надхвостьемъ и верхними кроющими хвоста, изъ которыхъ только надхвостье съ едва замѣтными слѣдами черноватой чешуйчатости, и болѣе рѣзкимъ контрастомъ между горломъ съ зобомъ (которые свѣтлѣе и рыжѣе верха головы и зашейка) и нижнею грудью съ брюхомъ (которыя совершенно того же цвѣта какъ межлопаточная область). *C. sordidus* извѣстна всего въ двухъ экземплярахъ. Первый изъ нихъ, типъ GOULD'а, хранящійся въ Британскомъ музеѣ, птица въ сильно обношенномъ нарядѣ; на этикеткѣ ошибочно значится «Afghanistan», въ дѣйствительности же онъ происходитъ изъ сбора Dr. ADAMS'а въ сѣверномъ Кашмирѣ<sup>2)</sup>. Второй экземпляръ купленъ недавно W. ROTHSCHILD'омъ въ Тринг'ѣ отъ ТАНСВЭ; онъ въ свѣжемъ перѣ и добытъ будто-бы къ югу отъ оз. Иссык-куля въ Туркестанѣ въ декабрѣ 1900 г. Д-ръ E. HARTERT не сомнѣвается въ точности его мѣстонахожденія. Вполнѣ возможно, что форма эта свойственна именно Тянь-шаню, гдѣ раньше она оставалась еще не замѣченной, и что въ Кашмирѣ появленіе ея было случайно. Вопросъ о распространеніи ея остается такимъ образомъ совершенно открытымъ. — Всѣ остальные литературныя указанія, приводимыя подъ именемъ «*C. sordidus*» относятся

1) Bull. Brit. Orn. Club, XV, 1905, p. 92. — Ibis 1906, p. 82.

2) SHARPE, Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 317.