

не къ этому виду. Экземпляръ изъ Kargil'я въ Ладакѣ, добытый 23. X. 1873 HENDERSON'омъ и упоминаемый HUME'омъ¹⁾ и SHARPE'омъ²⁾, я самъ видѣлъ въ Британскомъ музеѣ; онъ оказался несомнѣннымъ *C. asiaticus*. Птицы изъ восточнаго Тибета представляютъ, какъ мы уже видѣли, вполне самостоятельный видъ — *C. przewalskii*. Наконецъ подъ «*C. sordidus*» изъ Алтая, Саяновъ и Прибайкалья авторы смѣшивали *C. middendorffi* SUSCHKIN 1904, *C. saturatus* DRESSER 1895 (= *C. bilkewitschi* ZARUDN. 1902 = *C. kiborti* MADAR. 1903) и *C. baicalensis* DRESSER 1892.

153. *Cinclus cashmeriensis* GOULD.

- 8670'. ♀ adlt., 26. I. 1900, дол. р. Чагрынь-голь, сѣв. склонъ вост. Нань-шаня.
с. 13.000'. juv 1-a vest., 30—31. VIII. 1900, рѣч. Чокъ-чю, сист. Дзэ-чю, прит. Меконга.
- 13.040'. juv. 2-a vest., I/3. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.
с. 11.000'. ♂ jun., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю (Меконгъ) къ сѣв. отъ г. Чамдо.
- 11.960'. ♂ jun., III/3. XI. 1900, рѣч. Дзэ-чю, прит. Рэ-чю, сист. Меконга.
- с. 15.000'. ♂ adlt., 3. III. 1901, верхов. рѣч. Го-чю, прит. верхн. Гэ-чю, сист. Дзэ-чю, прит. верхн. Меконга.
- 11.660'. ♀ adlt., 17—18. IV. 1901, рѣч. Дэнъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой рѣки.
- 10.910'. 2 juv. 1-a vest., II/2. VI. 1901, ущ. Хату, сѣв. скл. хрб. Бурханъ-Будда.
8640'. juv. 1-a vest. mut., II/3. VIII. 1901, окр. горд. Дань-гэръ-тинъ (Донкыра), юг.-в. Нань-шань.

Птенецъ, добытый въ концѣ VIII на рѣч. Чокъ-чю, имѣетъ уже отросшій хвостъ, бѣловатые кончики котораго отчасти отрепались; бѣлыя каемки на махахъ и большихъ и среднихъ кроющихъ крыла широкія; весь верхъ тѣла отъ лба до кроющихъ хвоста и малыхъ кроющихъ крыла сѣрый въ черныхъ чешуйкахъ; низъ тѣла отъ подбородка до кроющихъ хвоста бѣлый, у большинства перьевъ бурые кончики, особенно на зобѣ и груди; преобладающій цвѣтъ крыла и хвоста сѣрый, но закрытыя части ихъ перьевъ черноваты, какъ и концы маховъ. Молодая птица въ гнѣздовомъ нарядѣ изъ ущелья Хату совершенно такія же, но птица изъ окрестностей Дань-гэра замѣнила гнѣздовые перья на бокахъ груди и брюха и подхвостьѣ бурыми съ бѣлыми концами; середина груди и брюха, какъ и все остальное перо верха и низа тѣла у нея еще гнѣздовое, но рули совершенно уже безъ бѣлыхъ кончиковъ.

Октябрьская птица съ Баръ-чю вывода этого года и одѣта во второй

1) HENDERSON & HUME, Lahore to Yarkand, p. 189.

2) Scient. Res. Second Yarkand Miss., Aves, p. 97.