

одинаковы. Самъ GOULD<sup>1)</sup> и SHARPE<sup>2)</sup> не упоминаютъ о чешуйчатомъ рисункѣ на малыхъ кроющихъ крыла, лопаточныхъ и межлопаточной области, указывая, что рисунокъ этотъ ограниченъ только надхвостьемъ и верхними кроющими хвоста. То же самое говоритъ и DRESSER<sup>3)</sup>. OATES<sup>4)</sup> описываетъ остальную верхнюю сторону, противопоставляя ей межлопаточную область (mantle), такъ, что можно заключить о существованіи на ней чешуйчатого рисунка, но къ сожалѣнію не упоминаетъ о лопаточныхъ и малыхъ кроющихъ крыла. У всѣхъ нашихъ экземпляровъ чешуйчатый рисунокъ очень рѣзокъ на всѣхъ перечисленныхъ частяхъ тѣла; нѣсколько менѣе явственъ онъ однако на кроющихъ крыла, лопаточныхъ и нижней спинѣ у экземпляра съ Раскемъ-дарья, повидимому очень старой птицы. Весьма возможно, что разногласія въ описаніяхъ сводятся на возрастъ птицъ и отрепанность ихъ наряда.

Область распространенія *C. cashmeriensis* охватываетъ собою вѣроятно все Тибетское нагорье и горныя страны, прилежащія къ нему съ запада (Раскемъ-дарья, Гильгитъ, Ладакъ, Кашмиръ), юга (Гималаи до Сиккима, 9.000—14.000') и востока (отъ сѣв. склона восточнаго Нань-шаня до юго-западной Гань-су). На восточной окраинѣ Тибета его нашли: на сѣверномъ склонѣ Нань-шаня братья Грумъ-Гржимайло (Пьянь-до-го, 22. IV. 1890) и П. К. Козловъ (р. Чагрынь-голь); въ различныхъ мѣстахъ восточнаго Нань-шаня (Гань-су) Н. М. Пржевальскій и П. К. Козловъ (Дань-гэръ); въ бассейнѣ верхняго теченія Желтой рѣки: Н. М. Пржевальскій въ хребтѣ Джупаръ или Ревенномъ (IV. 1880), въ хребтѣ Бурханъ-Будда Н. М. Пржевальскій (Номохунъ-голь, II. 1873), В. И. Роборовскій (Цаганъ-оботу, I. 1895) и П. К. Козловъ (ущ. Хату); на сѣверной окраинѣ Тибета Н. М. Пржевальскій (Найджинъ-голь, I. 1880); въ бассейнѣ верхняго теченія Синей рѣки: Н. М. Пржевальскій (Ды-чю при впадении рѣч. Конъ-чюнъ-чю, VI, 1884), П. К. Козловъ (рѣч. Дэнъ-чю), уже въ предѣлахъ Китая М. М. Березовскій<sup>5)</sup> въ юго-западной Гань-су (Си-гу, II; Лотани, X) и препараторъ STUAN'а<sup>6)</sup> въ сѣверо-западной Сычуани (Сунь-пань, X); въ бассейнѣ верхняго Меконга П. К. Козловъ (см. перечень матеріаловъ) и экспедиція принца Г. Орлеанскаго и Бонвало<sup>7)</sup> къ западу отъ Чамдо и Rutchi (Dutchme, 2. V. 1890); наконецъ, въ си-

1) Proc. Zool. Soc. London, 1859, p. 464; Birds Asia, IV, tab. 25.

2) Cat. B. Brit. Mus., VI, p. 312 (1881).

3) Ibis, 1892, p. 384; Birds Europe, IX, pp. 17 et 20.

4) Faun. Brit. India, Birds, II, p. 162.

5) Aves expedit. Potanini, p. 102 (1891).

6) Ibis, 1899, p. 294.

7) Nouv. Arch. Mus. Paris, (3) V, 1893, p. 187.