

longitudinis culminis longiore. Vertex cristae destitutus. Rhachides tectorium caudalium haud rigidae. Coloratio generalis colorationi formarum generis *Babax* similis, sed vitta malari nulla et gutture praepectoreque discoloribus.

Typus generis: *Babax waddelli* Dresser 1905.

Genus *Tibeti* orientali-meridionalis indigena.

Родъ этот я называю въ честь члена Тибетской экспедиціи 1899—1901 А. Н. Казнакова, а нижеописываемый новый видъ въ честь П. К. Козлова.

154. *Kaznakowia kozlowi* BLANCHI,

Bull. Acad. Scienc. St.-Pétersb., (5) XXIII, 1905, pp. 47—48.

- c. 12.000'. a, b, c—f, p. 2 ♀ adlt., 3 ♂, ♀ juv. 1-я vest., 1. IX. 1900, ущ. Шерчжи,
р. Дзэ-чю, прит. Дза-чю или верхн. Меконга.
- 13.040'. g, h. ♂, ♀ adlt., II/3. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист.
Меконга.
- c. 11.000'. i. ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю (Меконгъ) къ сѣв. отъ
г. Чамдо.
- 11.960'. l, m, n. 2 ♂, ♀ adlt., XI. 1900, рѣч. Дэ-чю, впад. въ Рэ-чю, лѣв.
прит. Меконга.
- 11.960'. o, n. ♂, ♀ adlt., XII. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

Видъ этотъ рѣзко отличается отъ *K. waddelli* (DRESSER) полнѣйшимъ отсутствиемъ на всемъ тѣлѣ буро-чернаго цвѣта. Весь верхъ тѣла, отъ клюва до конца крыльевъ и хвоста, у него темно-коричневый, нѣсколько бурѣе на головѣ, особенно на лбу, гдѣ въ безуокоризненно свѣжемъ перѣ на перышкахъ замѣтны очень узкіе бурые ободки и черные стержни; на межлопаточной области замѣчается поблѣдненіе коричневаго цвѣта къ краямъ перьевъ, а на зашейкѣ и бокахъ шеи края перьевъ свѣтло-пепельные; примѣсь сѣраго цвѣта замѣтна кромѣ того и на вѣшнихъ опахалахъ наружныхъ маховъ первого разряда, но рули сверху почти одноцвѣтны, съ коричневыми же стержнями, а снизу болѣе свѣтлаго коричневаго цвѣта. На нижней сторонѣ тѣла коричневый цвѣтъ болѣе блѣднаго оттѣнка, чѣмъ сверху, тоже преобладаетъ; бока головы въ общемъ сѣроватые, уздечки темнѣе, перья надглазной области въ коричневыхъ наствольяхъ, перья щекъ и области за основаниемъ нижней челюсти съ ярко-коричневыми вершинными пятнышками, ушныя буровато-коричневыя; подбородокъ и горло довольно чистаго пепельно-сѣраго цвѣта; зобъ, грудь, бока всего тѣла, подхвостье, нижнія кроющія крыла и перья голеней свѣтло-коричневые, перья къ краямъ болѣе блѣднаго цвѣта, на срединѣ же груди съ широкими свѣтло-сѣрыми каймами, которыя на серединѣ брюха достигаютъ такой ширины, что она кажется сплошь рыжевато-сѣрой. — Самки окрашены какъ самецъ; молодыя птицы въ первомъ нарядѣ какъ старыя, только перья у нихъ рыхлѣе, а потому