

большинство оттѣнковъ мутнѣе. Клювъ черный, у молодыхъ птицъ съ блѣднымъ, желтоватымъ кончикомъ. Ноги черныя, но подошвы желтоватыя; у молодыхъ птицъ бурыя, подошвы и когти бѣловатые. Общая длина тѣла ♂ около 338, ♀ 321; размахъ крыльевъ ♂ 363, ♀ 380; длина крыла ♂ 122, ♀ 117; хвоста ♂ 157, ♀ 155, culmen ♂ 36, ♀ 37, плюсна ♂ 41.5, ♀ 40 mm.

Типами я избираю ♂ и ♀ adlt., II/3. X. 1900, р. Барь-чю и ♂ juv. 1-a veste, нач. IX. 1900, р. Дзэ-чю.

Латинскій діагнозъ¹⁾ этого вида можетъ быть выраженъ такъ:

Kaznakowia coloratione praevalentem cinnamomeam, plumis ubique striis medianis nigris destitutis; notaeo toto obscure-cinnamomeo, plumis marginem versus plus minusve pallidioribus, plumis frontis rhachidibus nigris in ptilosique autumnali integra marginibus tenuissimis variegatis, plumis interscapulii marginibus pallidioribus, plumis cervicis laterumque colli marginibus latioribus cinereis, primariis externis pogonio externo cinerascentibus, rectricibus fere unicoloribus cinnamomeis; lateribus capitis cinerascentibus, loris obscurioribus, plumis superciliaribus striis medianis cinnamomeis, plumis regionis infraorbitalis et mentalis maculis apicalibus laete-cinnamomeis ornatis, auricularibus brunneo-cinnamomeis; gutture summo cinereo, praepectore, pectore, lateribus corporis totis, subcaudalibus, tectricibus alae inferioribus et tibialibus laete-cinnamomeis, marginibus pallidioribus, plumis pectoris medii marginibus latis cinereis, plumis abdominis medii marginibus latissimis rufesceni-cinereis. Femina mari, juvines feminae similes. Rostro pedibusque nigris, plantis albescientibus. Long. tot. ♂ 338, ♀ 321, latit. ♂ 363, ♀ 380; long. alae ♂ 122, ♀ 117; caudae ♂ 157, ♀ 155; culminis ♂ 36, ♀ 37, tarsi ♂ 41.5, ♀ 40.0 (Typ. in Mus. Zool. Acad. Caesar. Rossic. conserv., ♂, ♀ adlt., II/3 X. 1900, fl. Bar-tschu, ♂ juv., init. IX. 1900, fl. Dze-tschu, affluent. fluminis Mekong dictae in Tibeto merid-orient.).

Размѣры 15 приведенныхъ экземпляровъ въ миллиметрахъ слѣдующие:

	Крыло.	Хвостъ.	Culmen.	Обн. culm.	Плюсна.	Средн. пал. съ когт.
g. ♂ adlt. . .	122.0	157.0	36.0	31.0	41.5	32.5
i. ♂ adlt. . .	112.5	148.0	33.0	27.0	40.5	—
k. ♂ adlt. . .	112.5	151.0	34.5	27.25	39.5	—
l. ♂ adlt. . .	114.5	156.0	32.5	27.0	38.5	—
o. ♂ adlt. . .	119.0	155.0	38.0	32.5	40.0	—
a. ♀ adlt. . .	115.0	—	35.0	28.5	40.5	—

1) Въ Bull. Acad. Sc. St.-Pétersb., (5) XXIII, 1905, p. 47—48, выпущена фраза *plumis interscapulii pallidioribus*; кроме того невѣрно указана длина culmen'a: вм. 34 у ♂ и ♀, должно быть у ♂ 36, у ♀ 37 и при описаніи низа тѣла вмѣсто *supracaudalibus* д. б. *subcaudalibus*.