

мелкое перо. Старая самка съ Баръ-чю, добытая въ послѣднюю треть сентября, смѣнила перья на всемъ низѣ тѣла, перья верха головы и частью перья крыльевъ и хвоста, но горло и спина одѣты еще въ старыя. Молодыя съ Баръ-чю заканчиваютъ уже смѣну мелкаго пера. Въ октябрѣ, по словамъ П. К. Козлова, попадаются еще неполнѣ вылинявшія особи, но въ ноябрѣ всѣ уже въ свѣжемъ нарядѣ.

Гнѣздовой нарядъ очень походитъ на окончательный, но у находящихся въ немъ молодыхъ птицъ имѣется вполне явственныя грязно-соловья или бѣлесоватыя бровь и широкая полоса, идущая отъ основанія нижней челюсти по бокамъ горла приблизительно до конца ушныхъ. Коль скоро молодая птица перелиняла изъ гнѣздового наряда въ окончательный и бровь, и усовидная полоса исчезаютъ; существованіе послѣдней у молодой птицы указываетъ на происхожденіе *Tr. ellioti* отъ формы, имѣвшей эту полосу.

У взрослыхъ птицъ въ поношенномъ нарядѣ замѣчается поблѣдненіе верха головы уже въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, въ сильно же обитомъ нарядѣ перья лба и темени становятся бѣлесовато-сѣроватыми. У очень отрепанныхъ птицъ (♂ adlt., Сининъ, кон. VIII) перья дѣлаются сѣроватыми на концахъ даже на спинѣ и надхвостьѣ. Золотисто-желтый налетъ на средней парѣ рулей, очень рѣзкій у молодыхъ и свѣже вылинявшихъ старыхъ птицъ, постепенно исчезаетъ, такъ что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ рули эти становятся сплошь сѣрыми. М. М. Березовскій и я¹⁾ уже имѣли случай замѣтить, что *Tr. przewalskii* МЕНЗВ. 1887²⁾ представляетъ именно обношенный нарядъ *Tr. ellioti*; теперь я могъ убѣдиться въ этомъ вторично на очень обширномъ матеріалѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что и *Tr. ellioti* var. *bonvaloti* ОУСТ.³⁾, установленный по майскимъ экземплярамъ изъ юго-восточнаго Тибета, представляетъ тоже обношенный нарядъ *Tr. ellioti*.

Тибетская экспедиція П. К. Козлова впервые встрѣтила этотъ видъ въ центральной части восточнаго Нань-шаня у кумирни Чортэнтанъ въ февралѣ, гдѣ онъ держался въ кустарныхъ заросляхъ ущелій, большею частью парами иногда въ обществѣ съ *Pterorrhinus davidi*. Въ глубинѣ лѣсовъ П. К. Козловъ не встрѣчалъ его. Далѣе она была обыкновенна какъ въ бассейнѣ Меконга, такъ и въ области верхняго теченія Голубой рѣки, на возвратномъ же пути встрѣчена въ окрестностяхъ г. Синина.

Область распространенія *Tr. ellioti*, начинаясь на сѣверо-западѣ въ Сѣверо-Тэтунгскомъ хребтѣ, гдѣ его находили Пржевальскій и братья Грумъ-Гржимайло, охватываетъ всю восточную окраину Тибета къ югу

1) *Aves exp. Potanini*, p. 57 (1891).

2) *Ibis*, 1887, p. 300.