

до окрестностей Чамдо въ бассейнѣ верхняго Меконга, гдѣ его нашла кромѣ П. К. Козлова и экспедиція принца Г. Орлеанскаго и Бонвало (Chatou, 10. V и Gajeau = Gajung apud OUST., 13. V. 1890¹⁾), и до Дадзянь-лу въ центральной Сы-чуани; къ востоку онъ распространяется по Голубой рѣкѣ до ущелья И-чанъ (Ichang gorge), откуда его получалъ СТУАН²⁾, а въ бассейнѣ Желтой рѣки до провинціи Шань-си, гдѣ его добывали и DAVID, и М. М. Березовскій.

158. *Pomatorrhinus gravivox dedekensi* OUST.

? *Pomatorrhinus maclellandi* var. *dedekensi* OUST. 1892, Ann. Sc. Natur., Zool., (7) XII, pp. 276, 304; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) V, 1893, p. 197.

? *Pomatorrhinus maclellandi* var. *armandi* OUST., 1892, l. c., p. 277, 1893, p. 199.

11.430'. ♀ adlt., 27—30. X. 1900, р. Ному-чю, прит. Меконга.

с. 11.000'. 3 ♂, 4 ♀ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю (Меконгъ) къ сѣв. отъ г. Чамдо.

11.960'. 1 ♂, 1? adlt., II/2. XI. 1900, р. Дэ-чю, впад. въ Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

11.960'. ♀ adlt., XII. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

Всѣ птицы въ свѣжемъ осеннемъ перѣ, нѣсколько сильнѣе обносились лишь самка съ Рэ-чю. У пяти птицъ замѣчаются болѣе или менѣе явственные слѣды темныхъ вершинныхъ пятнышекъ на бѣлыхъ перьяхъ не только середины груди, но и брюха. Возможно, что эти особи нѣсколько моложе тѣхъ, которыя не имѣютъ этихъ пятнышекъ.

Радужина по словамъ П. К. Козлова бѣловатая.

Тибетская экспедиція нашла эту форму лишь въ окрестностяхъ Чамдо на мѣстѣ своей зимовки при урочищѣ Лунъ-ток-ндо и къ сѣверо-западу отъ этого мѣста въ области лѣвыхъ притоковъ Меконга. У Лунъ-ток-ндо онъ «встрѣчался очень рѣдко и держался по кустарнымъ зарослямъ и луговымъ площадямъ ущелій и долинъ рѣчекъ (Меконга)». Въ долину Дза-чю попадался, судя по числу добытыхъ экземпляровъ, нѣсколько чаще. «Образомъ жизни онъ не отличается отъ *P. gravivox*».

P. gravivox dedekensi OUST. 1892 представляетъ несомнѣнно обособленную отъ *P. gravivox* форму, но только подвидоваго значенія, такъ какъ, имѣя отдѣльную область распространенія, отличается отъ типичной формы лишь относительными, количественными признаками, именно: оливково-бурымъ безъ рѣзкой рыжины верхомъ тѣла, отсутствіемъ примѣси бураго цвѣта къ ярко-рыжему боковъ тѣла, болѣе явственными поперечными полосами на руляхъ, изогнутымъ болѣе рѣзкой дугой клювомъ и нѣсколько

1) Nouv. Arch. Mus. Paris, (3) V, 1893, p. 194.

2) Ibis, 1894, 330.