

большимъ ростомъ: длина крыла варьируетъ у ♂ отъ 102 до 96.5, у ♀ 92.5—91.0 mm. вмѣсто 97—89 у ♂ и 92—84 у ♀ типичнаго *P. gravivox*. Полная увѣренность въ точномъ опредѣленіи *P. dedekensi* можетъ быть получена лишь при непосредственномъ сравненіи его съ экземплярами типичной формы, а на границѣ распространенія обѣихъ формъ несомнѣнно должны попадаться промежуточные особи, которыхъ нельзя будетъ отнести съ увѣренностью ни къ той, ни къ другой формѣ. Область распространенія *P. gravivox gravivox* намѣчается сборами А. DAVID'а и М. М. Березовскаго. Первый нашелъ его въ горахъ южной Шень-си и сѣверной Сычуани, а также въ хребтахъ, которые отдѣляютъ эти провинціи отъ Ху-бэй (Ho-pe) и Хэ-нань (Ho-nan). М. М. Березовскій доказалъ его существованіе къ западу отъ мѣстонахожденій DAVID'а и добылъ его какъ въ южной, лежащей уже въ бассейнѣ Голубой рѣки, части Гань-су, именно въ округахъ городовъ Си-гу (деревни Сатани, Іо-дзамъ-пу, Джоза-паза и Чаго) и Хой-сяня, такъ и въ сѣверо-западномъ углу Сычуани въ ущельи Хо-цзи-гоу къ сѣверу отъ города Лунь-н'гань-фу. Область распространенія *P. gravivox dedekensi* охватываетъ, поскольку пока извѣстно, горы центральной Сычуани (въ области г. Да-дзянь-лу) и бассейнъ верхняго Меконга въ юго-восточной части Тибета. Къ перечисленнымъ выше мѣстонахожденіямъ Тибетской экспедиціи можно добавить только Tsonghai тоже въ бассейнѣ Меконга, гдѣ одинъ экземпляръ былъ добытъ принцемъ Г. Орлеанскимъ и Бонвало.

Изъ описанія *P. maclellandi* var. *armandi* OUST. я не вижу какихъ бы то ни было отличій отъ *P. dedekensi*, а потому считаю единственный экземпляръ, добытый тоже въ Да-дзянь-лу, относящимся къ *P. dedekensi*.

*P. gravivox* отличается отъ *P. maclellandi* изъ Ассама и Манипура повидимому специфически, такъ какъ у послѣдняго нижнія кроющія хвоста и голени не одноцвѣтныя съ боками брюха, а въ рѣзкомъ контрастѣ съ ними; въ этомъ отношеніи *P. maclellandi* сходенъ съ *P. erythrocnemis* GOULD, свойственнымъ Формозѣ. Всѣ эти виды принадлежатъ къ той группѣ рода *Pomatorrhinus*, представители которой не имѣютъ сплошной бѣлой брови.

Группу эту составляютъ слѣдующія пока извѣстныя формы.

1. *P. gravivox gravivox* DAVID, 1873, Ann. Sc. Nat., XVIII, Art. V, p. 2. — BERZOWSKI et BIANCHI, Aves exped. Potanini, p. 64. (1891). — DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, tab. 49. — Область распространенія указана выше.

2. *P. gravivox dedekensi* OUSTALET, 1891, Ann. Sc. Nat., Zool., (7) XII, p. 276; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, (3) V, 1893, p. 197, tab. 4, fig. sup. — Область распространенія приведена уже выше.

3. *P. maclellandi* GODW.-AUST., 1870, Journ. As. Soc. Bengal, XXXIX, ii, p. 104. — OLATES, Faun. Brit. Ind., Birds, I, p. 125 (1889). — Fig. nulla. — Ассамъ (Dibrugarh, Brail range, Naga hills, Shillong) и Манипуръ.