

4. *P. erythrocnemis* GOULD, 1862, Proc. Zool. Soc. London, p. 281. — SHARPE, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 427 (1883). — GOULD, B. Asia, III, tab. 33. — Верхний поясъ горъ Формозы.
5. *P. swinhoei* DAVID, 1874, Ann. Sc. Nat., XIX, Art. 9. — DAVID et OUSTALET, Ois. Chine, p. 184, tab. 48 (1877). — Горные хребты, отдѣляющіе пров. Цзянь-си (Kiang-si) отъ Фу-цзянь (Fo-kien), въ юго-восточномъ Китаѣ.
6. *P. erythrocnemis* VIGORS, 1831, Proc. Zool. Soc. London, p. 173. — OATES, Faun. Brit. Ind., Birds, I, p. 124. — GOULD, Cent. Himal. B., tab. 55. — Гималаи отъ Мурри до Бутана, 2.—10.000', Khasi hills и горы Индокитая отъ Бамо до Тенассерима.
7. *P. hypoleucus* (BLYTH), 1844, Journ. As. Soc. Bengal, XIII, p. 371. — OATES, Faun. Brit. Ind., B., I, p. 126. — GRAY et MITCH., Gen. B., I, tab. 57. — Ассамъ отъ хребта Дафла до Садіи; хребты Гаро, Кази и Нага; Качаръ, Манипуръ и Аппаканъ.
8. *P. tickelli tickelli* HUMMEL, 1877, Str. Feath., V, p. 32 (ex Blyth, MS); OATES, Faun. Brit. Ind., B., I, p. 127. — Fig. nulla. — Тенассеримъ.
9. *P. tickelli hainanus* ROTHSCH., 1903, Bull. Brit. Orn. Cl., XIV, p. 9. — О-въ Хайнань.
10. *P. tickelli wrayi* SHARPE, 1887, Proc. Zool. Soc. London p. 437. — Горы Перака на Малаккѣ.
11. *P. isidorii* LESSON, 1826, въ DUPERRÉY, Voy. Coquille, Zool., i, p. 680, tab. 29. — SHARPE, Cat. B. Brit. Mus., VII, p. 432. — Новая Гвинея и прилежащія острова.

Считаю необходимымъ привести синоптическую табличку всѣхъ этихъ формъ, такъ какъ таблица SHARPE'а сильно устарѣла, а таблица OATES'а обнимаетъ виды, свойственные лишь Британской Индіи.

- 1 (10) На зобу обыкновенно 2—3 ряда, но иногда всего 2—3 рѣзко очерченныхъ, темныхъ (черныхъ, бурыхъ или оливково-сѣрыхъ) треугольныхъ пятнышекъ, помѣщающихся на концѣ пера такъ, что вершина треугольника направлена къ основанію и приходится на стержнѣ. — Самая передняя часть лба ярко-рыжая.
- 2 (9) Середина нижней груди и брюха бѣлая или бѣловатая, въ рѣзкомъ контрастѣ съ рыжевато-бурыми или ярко-рыжими боками груди.
- 3 (6) Нижнія кроющія хвоста и голени ярко-рыжія въ незначительномъ контрастѣ съ боками брюха, которые по крайней мѣрѣ отчасти ярко-рыжіе.
- 4 (5) Верхъ тѣла оливково-бурый съ явственной примѣсью рыжаго цвѣта. На бокахъ тѣла къ ярко-рыжему цвѣту примѣшанъ рыжевато-бурый. Рули съ едва замѣтными поперечными полосками. Нѣсколько мельче: крыло ♂ 97—89, ♀ 92—84 mm. *P. gravivox gravivox.*
- 5 (4) Верхъ тѣла оливково-бурый безъ явственной рыжины. Бока всего тѣла ярко-рыжіе, безъ примѣси бураго, замѣтнаго лишь на подреберьяхъ. Рули съ болѣе явственными поперечными полосами. Нѣсколько крупнѣе: крыло ♂ 102—96.5, ♀ 92.5—91.0 mm. *P. gravivox dedekensi.*
- 6 (3) Нижнія кроющія хвоста и голени темно-каштановыя или густо-ржаваго цвѣта, въ рѣзкомъ контрастѣ съ рыжевато-бурыми или оливково-бурыми боками брюха.
- 7 (8) Верхъ всего тѣла, бока шеи, открытыя части маховъ и рулей оливково-бурые. Ушные коричневые. Середина груди и брюха бѣлая. Нѣсколько мельче: крыло ♂ 86.5—82.5, ♀ 84—76 mm. *P. macclellandi.*
- 8 (7) Верхъ головы, зашеекъ и бока шеи оливково-бурые; остальной верхъ тѣла, открытыя части маховъ и рулей буро-каштановые. Ушные сѣровато-бурые съ рыжимъ пятнышкомъ. Середина груди и брюха буровато-бѣлая. Нѣсколько крупнѣе: крыло 97—90 mm. *P. erythrocnemis.*
- 9 (2) Середина нижней груди и брюха свѣтло-сѣрая, одноцвѣтная съ сѣрыми боками груди, въ слабомъ контрастѣ съ рыжевато-сѣрыми боками брюха и голени. — Нижнія кроющія хвоста рыже-каштановыя. Ушные ярко-рыжія. Верхъ головы буро-оливковый; зашеекъ и надхвостье рыже-оливковые; спина