

и открытыя части перьевъ крыла яркаго каштаново-рыжаго цвѣта; хвостъ рыжій съ оливковымъ оттѣнкомъ. Крыло около 100 mm.

P. swinhoei.

- 10 (1) Перья зоба безъ рѣзко очерченныхъ темныхъ наствольевъ на концѣ, сплошь бѣлыя или свѣтло-сѣрыя въ конечной и бѣлыя въ основной части.
- 11 (20) На нижней сторонѣ тѣла есть бѣлый цвѣтъ, по крайней мѣрѣ на серединѣ груди и брюха.
- 12 (13) Бока груди ярко-рыжіе, одноцвѣтные съ боками шеи и брюха и нижними кроющими хвоста. Передняя часть лба, ушные и голени ярко-рыжія. — Верхъ тѣла, открытыя части перьевъ крыла и хвоста оливково-бурые; перья горла и зоба блѣдно-сѣрыя, у основанія бѣлыя; середина груди и брюха бѣлая. Крыло 91—102 mm.
- P. erythrogeus.*
- 13 (12) Бока груди пепельно-сѣрые въ бѣлыхъ наствольяхъ, въ контрастѣ съ рыжеватато бурыми или рыже-пепельными боками брюха и ржавыми или рыжеватобурыми нижними кроющими хвоста. Передняя часть лба одноцвѣтная съ остальнымъ верхомъ головы; ушные рыжеватато-, сѣровато- или блѣдно-бурыя; голени рыжеватато-сѣрыя или рыжеватато-бурыя.
- 14 (15) Бока шеи безъ бѣлыхъ полосокъ. — Верхъ тѣла оливково-бурый съ рѣзкимъ рыжимъ оттѣнкомъ на открытыхъ частяхъ перьевъ крыла и хвоста; у adult отъ глаза надъ ушными тянется ярко-каштановая полоска, оканчивающаяся позади ушныхъ въ одноцвѣтное съ ней пятно; у juv. этой полоски и пятна нѣтъ; горло, грудь и брюхо бѣлыя, на груди небольшое число сѣрыхъ пятнышекъ. Крыло ок. 105—110 mm.
- P. hypoleucus.*
- 15 (14) Перья надъ ушными и боковъ тѣла въ бѣлыхъ полоскахъ. Въ остальномъ близки къ *P. hypoleucus*, отъ котораго отличаются лишь оттѣнками цвѣтовъ различныхъ частей тѣла.
- 16 (19) Всюду свѣтлѣе; верхъ головы одноцвѣтенъ со спиной; хвостъ оливково-бурый съ интенсивнымъ рыжимъ оттѣнкомъ.
- 17 (18) Преобладающій цвѣтъ верха тѣла яркій оливково-бурый съ рыжимъ оттѣнкомъ, особенно на открытыхъ частяхъ перьевъ крыла и хвоста; бока тѣла рыже-пепельные. Нѣсколько крупнѣе: крыло 110—102 mm.
- P. tickelli tickelli.*
- 18 (17) Преобладающій цвѣтъ верха тѣла оливково-бурый со слабой примѣсью рыжеватато; бока тѣла оливково-бурые. Нѣсколько мельче: крыло 101—97 mm.
- P. tickelli hainanus.*
- 19 (16) Всюду темнѣе; верхъ головы болѣе темнаго бурога цвѣта, чѣмъ спина, со слабымъ рыжеватымъ оттѣнкомъ; преобладающій цвѣтъ хвоста черный, по наружному опахалу перьевъ, особенно ближе къ основанію, съ рыжеватобурымъ оттѣнкомъ. Крыло около 105 mm.
- P. tickelli wrayi* 1).
- 20 (11) Бѣлаго цвѣта на нижней сторонѣ тѣла вовсе нѣтъ. Верхъ тѣла землисто-бурый, крылья рыже-бурыя, верхнія кроющія хвоста и хвостъ каштановые; весь низъ рыжій, свѣтлѣе всего на горлѣ, темнѣе всего на подхвостѣ, которое каштановаго цвѣта. Крыло 107—116 mm.
- P. isidori.*

159. *Proparus striaticollis* (Verr.).

с. 11.000'. ♂ adlt., 4—10. XI. 1900, р. Дза-чю или верхн. Меконгъ къ сѣв. отъ г. Чамдо.

11.960'. 2 ♂, ♀ adlt., II/2. XI. 1900, рѣч. Дэ-чю, впад. въ Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

11.960'. 4 ♂, ♀ adlt., XII. 1900, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

1) Повидимому *P. tickelli* въ сильно обношенномъ перѣ.