

Всѣ экземпляры въ свѣжемъ замнемъ нарядѣ уже безъ признаковъ линянiя.

«Этотъ видъ былъ впервые найденъ экспедиціей по приходѣ на Меконгъ. Тутъ была замѣчена стайка изъ 5—6 особей, медленно пролетавшая по горному склону, одѣтому кустарниковой зарослью. Поведеніемъ своимъ птички напоминали синицъ, лазали по вѣтвямъ кустовъ или спускались въ траву, относились очень довѣрчиво къ человѣку и медленно удалились послѣ выстрѣла. Второй экземпляръ былъ добытъ на рѣчкѣ Ярма-нанъ» 16—17, XI, а слѣдующіе тоже на различныхъ рѣчкахъ, впадающихъ въ Меконгъ, въ томъ числѣ и на Рэ-чю. «Птички изрѣдка встрѣчались по ущельямъ и держались среди древовиднаго можжевельника, въ особенности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лѣсъ образовалъ открытыя лужайки».

Экземпляры, добытые экспедиціей П. К. Козлова, я сравнивалъ съ типомъ въ Парижскомъ музеѣ и не нашелъ въ нихъ никакого различiя. Ближайшимъ родственникомъ *Pr. striaticollis* является *Pr. guttaticollis* LA TOUCHE изъ сѣверо-западной части провинціи Фу-цзянь (Fo-kien). Послѣдній представляетъ хорошій видъ, легко отличающійся бѣлой уздечкой (которая у *Pr. striaticollis* черная), отсутствіемъ всякихъ слѣдовъ темныхъ наствольевъ на верхѣ головы, который тоже почти одноцвѣтенъ съ бурой, оттѣнка сепiи, спиной, но нѣсколько блѣднѣе и ярче, наконецъ тѣмъ, что свойственныя *Pr. striaticollis* темныя конечныя наствольныя полосы на перьяхъ горла и зоба замѣнены у *Pr. guttaticollis* неявственными, болѣе блѣдными вершинными пятнышками.

Область распространенiя *P. striaticollis* охватываетъ юго-восточную окраину Тибета отъ Сунь-паня въ сѣверной Сы-чуани до Мупина и окрестностей Чамдо.

160. *Leptopocile sophiae sophiae* SEWERTZ.

7100'. ♀ adlt., II. 1900, кум. Чортэнтанъ, р. Тэтунгъ, Нань-шань.

10.000'. ♀ juv., 8—10. VIII. 1901, кум. Дуланъ-китъ, южн. окраина Южно-Куку-норскаго хребта.

с. 12.000'. ♂ juv., II/з. VIII. 1901, хреб. Южно-Кукунорскій.

Темная окраска вообще, преобладаніе бураго оттѣнка на спинѣ и верхней сторонѣ крыльевъ въ частности и интенсивность синяго цвѣта на надхвостьѣ и бокахъ брюха у взрослой самки позволяютъ отнести всѣхъ вышеперечисленныхъ птицъ къ этой формѣ съ полною увѣренностью. Молодой самецъ рѣзко отличается отъ молодыхъ самцовъ *L. sophiae obscura*, добытыхъ Н. М. Пржевальскимъ на Ды-чю, свѣтлымъ полемъ на серединѣ