

задней части груди и брюха. У взрослой самки оливковый оттънокъ явственнѣе, чѣмъ у самки *L. obscura*.

У молодой самки изъ кумирни Дуланъ-китъ начало линять перо на головѣ и шеѣ. Рулевья перья молодого самца не достигли еще окончательной длины.

Во время путешествія была встрѣчена впервые въ январѣ мѣсяцѣ въ оазисѣ Лянъ-чжоу, куда спустилась по мнѣнію П. К. Козлова съ Нанъ-шаня. Затѣмъ «была довольно обыкновенна въ февралѣ мѣсяцѣ въ глубокихъ ущельяхъ рѣки Ярмынь (Тэтунгъ-голь), особенно въ окрестностяхъ кумирни Чортэнтанъ, и держалась въ обществѣ *Lophobasileus elegans*, *Parrus*, *Poecile*, *Sitta* и другихъ пташекъ».

161. *Leptopoecile sophiae obscura* PRZEW.

- 13.730'. ♂ adlt., 1—6. VIII. 1900, ущ. Нко-гунъ у оз. Рхомбо-мцо, верх. р. И-чю, прит. Ды-чю или верхн. теч. Голубой рѣки.
 15.160'. ♂ adlt., ♀ juv., 8. IX. 1900, переваль Ментонъ-ла, водоразд. Дза-чю и Дза-чю или верхн. Меконга.
 13.040'. ♀ adlt., III/3. IX. 1900, рѣка Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.
 13.040'. 5 ♂ adlt., 1/2. X. 1900, рѣка Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.
 11.960'. 2 ♂, ♀ adlt., XII. 1900, рѣка Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.
 12.020'. 2 ♂, ♀ adlt., 1/2. IV. 1901, сел. Бана-джунъ на лѣв. бер. рѣчки Сэръ-чю, прит. Дза-чю, системы Голубой рѣки.

Оба сентябрьскихъ экземпляра, и взрослый, и молодой, съ перевала Ментонъ-ла начали мѣнять мелкое перо; по бокамъ горла у нихъ пеньки. «Въ ущельи Н'ко-гунъ ютилась въ заросляхъ кустарника вмѣстѣ съ пѣночками».

Какъ видно изъ списка матеріаловъ экспедиціи, П. К. Козловъ доставилъ значительное число экземпляровъ этой формы и тѣмъ много поспособствовалъ рѣшенію вопроса о ея таксономическомъ значеніи.

Покойный Н. М. Пржевальскій¹⁾ установилъ *L. obscura* на основаніи трехъ экземпляровъ (старого самца въ отрепанномъ лѣтнемъ перѣ и двухъ молодыхъ самцовъ въ гнѣздовомъ перѣ), добытыхъ имъ на верхнемъ теченіи Голубой рѣки, и считалъ эту форму за особый видъ. О. Д. Плеске²⁾, имѣвшій тотъ же самый матеріаль, сохранилъ за ней значеніе самостоятельнаго вида условно, причемъ высказалъ также взглядъ, что *L. obscura* можетъ представлять и наиболѣе интенсивно окрашенную форму *L. sophiae*.

1) Новые виды птицъ Центральной Азіи. — Записки Имп. Акад. Наукъ, т. LV, 1887, стр. 80.

2) Научн. результ. путешеств. Пржевальскаго, т. II, стр. 93 (1890).