

рѣки до Routhi къ сѣверо-западу отъ Чамдо въ бассейнѣ верхняго Меконга; къ востоку она простирается, насколько пока извѣстно, до юго-западной Гань-су и сѣверо-западной Сы-чуани. П. К. Козлову удалось доказать распространіе *L. obscura* по всему Каму и такимъ образомъ связать нахожденіе ея въ бассейнѣ верховьевъ Желтой рѣки съ находкой принца Г. Орлеанскаго и Бонвало въ Routhi. Отдѣльныя мѣстонахожденія въ теченіе Тибетской экспедиціи 1899—1901 гг. видны изъ списка матеріаловъ.

Уже послѣ напечатанія моей замѣтки¹⁾ о формахъ родовъ *Leptoprocile* и *Lophobasileus*, я имѣлъ возможность, благодаря любезности теперь уже покойнаго Ём. OUSTALET, изучить въ Парижскомъ Jardin des Plantes типъ *Leptoprocile henrici* изъ центральной части Тибетскаго нагорья и два экземпляра изъ Да-дзянь-лу, опредѣленныхъ тоже за *L. henrici*.

У типа дѣйствительно нѣтъ никакихъ слѣдовъ свѣтлыхъ бровей и лобной перевязи; что же касается двухъ послѣднихъ экземпляровъ, то они очень близки къ *L. obscura*, однако отличаются отъ нея болѣе сѣрымъ лбомъ и очень неявственной сѣрой, а не соловой съ рыжиной по верхнему краю, бровью; у самца лобъ какъ у *L. obscura*, но сѣрѣе, у самки коричневый цвѣтъ верха головы доходитъ почти до клюва, такъ что сѣроватая перевязь у основанія послѣдняго еще неявственнѣе, чѣмъ у самца; кромѣ того спина у самца повидимому бурѣе, чѣмъ у *L. obscura*, а самка бурѣе самки *L. obscura* какъ сверху, такъ и на зобу. Не рѣшаясь высказаться окончательно относительно самостоятельности дадзянлускихъ птицъ въ виду плохого состоянія типа *L. henrici*, ограничиваюсь констатированіемъ замѣченныхъ мною различій.

162. *Lophobasileus elegans* (PRZEW.).

7100'. 2 ♀ adlt., 1—4. III. 1900, кум. Чортэнтавь, р. Тэтунгъ-голь, Наньшань.

13.040'. 2 ♂ adlt., 21. X. 1900, р. Баръ-чю, прит. Ному-чю, сист. Меконга.

11.960'. ♀ adlt., I. 1901, р. Рэ-чю, лѣв. прит. Меконга.

с. 13.000'. ♂ adlt., 20—21. III. 1901, р. Намъ-чю, прит. Дза-чю, сист. Голубой р.

10.500'. ♂ adlt. mut., 8—10. VIII. 1901, кум. Дуланъ-китъ, юго-вост. окр. Южно-Кукунорскаго хребта.

Самецъ, добытый въ первой трети августа у кумирни Дуланъ-китъ, сильно линяетъ, мѣняя какъ мелкое перо, такъ и махи съ рулями; смѣна перьевъ крыла и хвоста говоритъ въ пользу того, что это старая птица, на что указываетъ также и обношенность еще несмѣненныхъ перьевъ.

1) Bull. Acad. Sc. St.-Petersb., (5) XXII, 1905, pp. 37—49.