

«Живетъ въ высокоствольныхъ хвойныхъ еловыхъ лѣсахъ и держится какъ по ихъ опушкамъ, такъ и внутри лѣса. Въ общемъ попадается рѣже, чѣмъ *Leptopoecile*. Осеню и зимою присоединяется къ обществамъ различныхъ синицъ (*Parus*, *Lophophanes*, *Poecile*), корольковъ (*Regulus*) и *Leptopoecile*».

### 163. *Rhopophilus pekinensis albosuperciliaris* (HUME).

c. 9000'. 3 ♂, 2 ♀ adlt., 1/3. IV. 1900, сѣв.-вост. Цайдамъ.

c. 9000'. ♂ juv., 1/3. VIII. 1900, вост. Цайдамъ.

Молодая птица еще въ гнѣздовомъ нарядѣ и всѣ размѣры ея, особенно клюва и хвоста, замѣтно меныше тѣхъ же размѣровъ взрослыхъ, но тѣмъ не менѣе махи и рули у нея совершенно отрасли и окрѣпли. Гнѣзовой нарядъ отличается отъ взрослого, помимо рыхлости покровныхъ перьевъ, только тѣмъ, что блѣдные ободки и каемки на маховыхъ перьяхъ развиты много сильнѣе.

«Эта вертлявая птичка встрѣтилась намъ при первомъ вступленіи въ сѣверную часть восточного Цайдама. Держится она въ чащѣ колючихъ кустарниковъ, гдѣ проворно шныряетъ отъ куста къ кусту или прыгаетъ тутъ по землѣ. Раннимъ утромъ въ теплую погоду самцы сидятъ на вершинахъ кустовъ и оглашаютъ воздухъ пріятнымъ пѣніемъ».

Въ Британскомъ музѣѣ я могъ сравнить экземпляры сборовъ Н. М. Пржевальского (*Rh. major* и *Rh. deserti*) и П. К. Козлова съ типами *Rh. albosuperciliaris* HUME и *Rh. pekinensis* SWINHOE. *Rh. deserti* оказался вполнѣ тождественнымъ съ *Rh. albosuperciliaris*. Послѣдній представляетъ лишь болѣе блѣдную форму *Rh. pekinensis*, отличаясь сѣрымъ общимъ оттенкомъ верха тѣла, который у *Rh. pekinensis* бурый, песочными, вместо рыжевато-бурыхъ, краями перьевъ верха тѣла и блѣдно-коричневыми полосками на бокахъ тѣла. Различія эти чисто относительныя, а потому я полагаю, что *Rh. albosuperciliaris* представляетъ не болѣе, какъ подвидъ *Rh. pekinensis*.

Области распространенія *R. pekinensis* и *R. albosuperciliaris* раздѣляются массивами Нань-шаня и Куку-нора. Первый свойственъ крайнему юго-восточному углу Монголіи, Ордосу и прилежащимъ къ нимъ провинціямъ сѣвернаго Китая; въ Шень-си его нашелъ DAVID на сѣверномъ склонѣ хребта Цзинь-линъ; въ Гань-су онъ прослѣженъ къ югу М. М. Березовскимъ до г. Хой-сяня, гдѣ онъ рѣдокъ, а Н. М. Пржевальскимъ по долинѣ верхней Хуанъ-хэ до уроцища Гоми, т. е. до самаго подъема на плато Тибета. *R. albosuperciliaris* населяетъ весь бассейнъ Та-