

у старыхъ самцовъ становится почти чернымъ. На бокахъ затылка кзаду отъ глаза явственное бѣлое пятнышко.

P. luteola.

- 3 (2) Большого бѣлаго пятна въ области большихъ кроющихъ маховъ 2-го разряда нѣтъ, такъ какъ перья эти одноцвѣтны или съ неявственной свѣтлой каемочкой. Махи 3-го разряда одноцвѣтны или съ неявственной болѣе блѣдной каемочкой. Аспидно-сѣрый цвѣтъ не сгущается до почти чернаго. На бокахъ затылка кзаду отъ глаза неявственное свѣтлое пятнышко. *P. hodgsoni.*
- 4 (1) Верхъ тѣла оливково-бурый съ б. или м. выраженной рыжиной: самки и по крайней мѣрѣ одногодовалые самцы, часто уже гнѣздящіеся.
- 5 (6) Махи 3-го разряда съ довольно широкой чисто-бѣлой или соловой каймой. Большая кроющія маховъ 2-го разряда съ широкими бѣлыми или бѣловатыми каймами. Подбородокъ и горло оливково-желтоватаго цвѣта. *P. luteola.*
- 6 (5) Махи 3-го разряда развѣ съ узкимъ блѣднымъ ободкомъ. Большая кроющія маховъ 2-го разряда съ неявственными блѣдными кончиками. Подбородокъ и горло бураго цвѣта. *P. hodgsoni.*

Молодыхъ одногодовалыхъ самцовъ, несомнѣнно уже гнѣздящихся, какъ доказалъ М. М. Березовскій¹⁾, собирали обыкновенно смѣшиваются съ самками и мѣтятъ невѣрнымъ поломъ. Несомнѣнную взрослую самку, птенца и отличія нарядовъ болѣе молодыхъ самцовъ *P. hodgsoni* мы описали уже въ обработкѣ птицъ экспедиціи Потанина.

Сем. *Hirundinidae.*

166. *Cotile riparia* (LINN.).

13.370'. ♂ и ♂? adlt., 31. V. 1900, оз. Алыкъ-норъ, бассейнъ верхн. теч. Желтой рѣки.

13.890'. ♀ adlt., VI. 1900, оз. Оринъ-норъ (Русское), басс. верхн. теч. Желтой рѣки.

с. 13.500'. ♂ adlt., I/3. V. 1901, сѣверные притоки Да-чю, сист. Голубой рѣки.

«Въ маѣ 1900 г. была обыкновенна на южныхъ обрывистыхъ берегахъ озера Алыкъ-норъ, гдѣ самки сидѣли уже на яйцахъ. На Да-чю, системы Голубой рѣки, появилась весною 1901 г. въ мартѣ, а въ апрѣль стала обыкновенной въ области сѣверныхъ притоковъ Да-чю».

Въ 1893 г. SHARPE²⁾ выдѣлилъ на основаніи двухъ экземпляровъ, добытыхъ Сѣверцовымъ на рѣкѣ Бадамъ близъ Чимкента въ Русскомъ Туркестанѣ, *Cotile diluta*, охарактеризовавъ ее такъ: «*C. similis C. ripariae*, sed ubique dilutior et torquaе praepectorali vix obvio». Въ коллекціи Сѣверцова имѣется экземпляръ съ рѣки Бадамъ и дѣйствительно онъ нѣсколько блѣденъ, но полуошейникъ на зобу у него хотя и сѣроватъ, все-же выраженъ чрезвычайно рѣзко, такъ что выраженіе «vix obvio» къ нему

1) BEREZOWSKI et BIANCHI, Aves Exped. Potanini, pp. 72—73 (1891).

2) SHARPE & WYATT, Mon. Hirundin., I, p. 63 (pt. XVI. 1893).